

承認リスト(医薬品、医薬部外品、化粧品、健康食品)

万協製薬株式会社

医薬品

皮膚軟化薬	2
みずむし・たむし用薬	5
外用鎮痛消炎薬	11
外用鎮痺消炎薬	14
外用痔疾用薬	21
うがい薬・歯科口腔用薬	24
化膿性疾患用薬	26
にきび治療薬	27
殺菌消毒薬	28
ひび・あかぎれ用薬	30
瀉下薬	31
消化器官用薬	32
その他 育毛剤	33
鼻炎用点鼻薬	33
ビタミン主薬製剤	33
呼吸器官用薬	33

医薬部外品

消毒剤	34
薬用化粧品	35
き避剤	35
口中清涼剤	37
腋臭防止剤	37
薬用歯みがき類	38
浴用剤	38
シャンプー	38
てんか粉類	38

化粧品

健康食品	43
食品添加物製剤	44
衛生雑貨品	44

※太線囲みは新規申請又は新規承認品目

皮膚軟化薬1

販売名	ヒルロイ泡フォーム	ヒルロイクリームα■	ヒルロイ乳液α■	エプール20DX■	ヒルロイローション	ヒルロイクリーム■	ヒルロイ乳液■
リスク分類	2	2	2	3	2	2	2
剤型	ポンプスプレー剤	w/o型クリーム剤	ローション剤	o/w型クリーム剤	外用液剤	w/o型クリーム剤	ローション剤
	100g中	100g中	100g中	100g中	100g中	100g中	100g中
成分分量	ヘパリン類似物質 0.3g アラントイン 0.2g トコフェロール酢酸エステル 0.5g	ヘパリン類似物質 0.3g アラントイン 0.2g トコフェロール酢酸エステル 0.5g	ヘパリン類似物質 0.3g アラントイン 0.2g トコフェロール酢酸エステル 0.5g	尿素 20.0g トコフェロール酢酸エステル 0.5g グリチルリチン酸一アンモニウム 0.5g パンテノール 1.0g	ヘパリン類似物質 0.3g	ヘパリン類似物質 0.3g	ヘパリン類似物質 0.3g
効能効果	手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあととの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛	乾皮症、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、小児の乾燥性皮膚、手指の荒れ、手足のひび・あかぎれ、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあととの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛	乾皮症、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、小児の乾燥性皮膚、手指の荒れ、手足のひび・あかぎれ、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあととの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛	手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、傷・火傷のあととの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打ち身・捻挫後のはれ・筋肉痛・関節痛	手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、傷・火傷のあととの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打ち身・捻挫後のはれ・筋肉痛・関節痛	手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、傷・火傷のあととの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打ち身・捻挫後のはれ・筋肉痛・関節痛	手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、傷・火傷のあととの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打ち身・捻挫後のはれ・筋肉痛・関節痛
用法用量	1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼなどにのばして貼る。	1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼ等にのばして貼ってください。	1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼ等にのばして貼ってください。	1日数回適量を患部に塗擦する。	1日1～数回、適量を患部に擦り込むか、又はガーゼ等にのばして貼る。	1日1～数回、適量を患部に擦り込むか、又はガーゼ等にのばして貼る。	1日1～数回、適量を患部に擦り込むか、又はガーゼ等にのばして貼る。
承認日	R4/2/25申請	令和3年3月30日	令和3年10月6日	令和3年10月6日	令和4年1月17日	令和2年11月10日	令和2年11月10日
一物多名称	ヒルロイ泡フォーム ヘパロイト泡フォーム ヘパロイトクリームα■ ヒルトベールα ヒルトリペアα リペアプロHPプラス	ヒルロイセ'クリームα ヒルロイセ'乳液α■ ヘパロイト乳液α■ ヒルトリペア乳液α リペアプロHPプラスローション ラホヤ20DX■ ウレコート20 α DX■ ウレコート素肌なめらかクリームDX■ アージュ20DX カナウ20DX	エカイ20DX■ オノエ20DX ヒケロイトローション ヒルロイセ'ローション エプール20DX■ ヒルロイセ'ローション■ ラホヤ20DX■ ヒルロイセ'ローション■ ヒルトベールクリーム アージュ20DX カナウ20DX	ヒケロインローション ヒケロインクリーム■ ヒケロイトクリーム■ ヒルロイセ'クリーム ヒルロイセ'乳液 ヘパロイトクリーム ヘパロインクリーム■ ヒルトベールクリーム ヒルロイセ'乳液	ヒケロインクリーム■ ヒケロイト乳液■ ヒケロイトクリーム■ ヒルロイセ'乳液 ヘパロイトクリーム ヘパロインクリーム■ ヒルトベールクリーム ヒルロイセ'乳液	ヒケロインクリーム■ ヒケロイト乳液■ ヒケロイトクリーム■ ヒルロイセ'乳液 ヘパロイトクリーム ヘパロインクリーム■ ヒルトベールクリーム ヒルロイセ'乳液	

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

皮膚軟化薬2

販売名	ヒフルHPソフトクリーム	ヒフルHPソフトローション■	ヒフルHPソフトクリームα	ヒフルHPソフトローションα	ヒフルHPクリーム■	テオブランカクリーム20	テオブランカ乳状液20■
リスク分類	2	2	2	2	2	3	3
性状	クリーム	ローション	クリーム	ローション	クリーム	クリーム	乳剤
成分分量	100g中 ヘパリン類似物質 0.3g ジフェンヒドラミン 1.0g	100g中 ヘパリン類似物質 0.3g ジフェンヒドラミン 1.0g	100g中 ヘパリン類似物質 0.3g トコフェロール酢酸エステル 0.5g アラントイン 0.2g ジフェンヒドラミン 1.0g	100g中 ヘパリン類似物質 0.3g トコフェロール酢酸エステル 0.5g アラントイン 0.2g ジフェンヒドラミン 1.0g	100g中 ヘパリン類似物質 0.3g	尿素 20.0g ジフェンヒドラミン塩酸塩 1.0g グリチルレチン酸 0.3g	尿素 20.0g ジフェンヒドラミン塩酸塩 1.0g グリチルレチン酸 0.3g
効能効果	かゆみを伴う乾燥性皮膚 (老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮ふ)	かゆみを伴う乾燥性皮膚 (老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮ふ)	かゆみを伴う乾燥性皮膚 (老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮ふ)	かゆみを伴う乾燥性皮膚 (老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮ふ)	手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮ふ、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあと(皮ふのしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛	かゆみをともなう乾燥性皮膚(成人・老人の乾皮症)	かゆみをともなう乾燥性皮膚(成人・老人の乾皮症)
用法用量	1日1～数回、適量を患部に塗布する。	1日1～数回、適量を患部に塗布する。	1日1～数回、適量を患部に塗布する。	1日1～数回、適量を患部に塗布する。	1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼなどにのばして貼る。	1日数回、適量を患部に塗擦する。	1日数回、適量を患部に塗擦する。
承認日	平成27年7月29日	平成27年9月18日	平成27年7月29日	平成27年9月18日	平成24年7月4日	平成18年3月3日	平成18年3月3日
一物多名称	エカイHPソフトクリーム	エカイHPソフトローション			ラウマーHPクリーム■	エフルクリーム20	エフル乳状液20
	オノフェHPソフトクリーム	オノフェHPソフトローション			ホヤHPクリーム	パルムユーハクリーム20	パルムユーホ乳状液20
	ハタ'エールGBローション■				エカイHPクリーム	ヒフルクリーム20	ヒフル乳状液20■
					オノフェHPクリーム■	オノフェクリーム20■	オノフェ乳状液20■
					オノフェHPクリーム■	ラウマークリーム20	オノフェ乳状液20■
					ラカナウHPクリーム	エカイクリーム20	ラウマー乳状液20
					キルカミンHPクリーム■		エカイ乳状液20
					テオブランカHPクリーム		ウレコート乳状液20■

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

皮膚軟化薬3

販売名	パルムU■	アスコートAD乳液■	エプール20α■	アネシス20	ボルネフロスト	ウインターボルネ
リスク分類	2	2	3	3	3	3
性状	クリーム	乳剤	クリーム	クリーム	芳香の白色クリーム	芳香の白色軟膏
成分分量	100g中 尿素 10.0g ジ'フェンヒドラミン塩酸塩 1.0g d-カンフル 1.0g リトカイン 2.0g トコフェロール酢酸エステル 0.3g	100g中 尿素 10.0g ジ'フェンヒドラミン塩酸塩 1.0g d-カンフル 1.0g リトカイン 2.0g トコフェロール酢酸エステル 0.3g	100g中 尿素 20.0g トコフェロール酢酸エステル 0.5g グリチルリチン酸モノアンモニウム 0.5g	100g中 尿素 20.0g	ビタミンA油 5.0mg トコフェロール酢酸エステル 10.0mg アラントイン 2.0mg グリチルリチン酸ジカリウム 5.0mg	100g中 トコフェロール酢酸エステル 2.0g グリチルリチン酸 0.3g ジ'パルミチン酸ピリドキシン 0.2g アラントイン 0.2g
効能効果	かゆみをともなう乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚)	かゆみをともなう乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚)	手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌	手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌	皮膚の保護、手のあれ、肌あれ、ひび、しもやけ、あかぎれ	指先・手のひらの荒れ、かかとの荒れ、ひび、あかぎれ、しもやけ
用法用量	1日1～数回、適量を患部に塗布する。	1日1～数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗擦する。	1日数回適量を患部に塗擦する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日1～数回患部に塗布する。
承認日	平成11年1月28日	平成15年3月3日	平成14年7月9日	平成11年11月19日	昭和63年11月24日	昭和63年1月21日
一物多名称	ウレコート■	アスコートADローション■	パンパスα■	エプール20		
	ウレアルファ■	ハートマロンプレミアローション■	ウレコート20α■	アージュ20		
	パンパスUX■	ウイスペールプレミアローション■	ラホヤ20α■			
	ヒフルUX	コンフラージュプレミアローション■	エカイ20α■			
	マンナUX■	パルムUローション■	リアス20α■			
	トラットUX■	ウレアルファローション■	オノフェ20α■			
	アージュUX■	エプールαローション	パルムユ-20α■			
	ラホヤUX	ウレコートローション■	ラウマ-20α■			
	エカイUX	パンパスαローション	ラカナウ20α■			
		ヒフルローション	コクソス20α			
		アージュローション■	ナルガ'20α			
		マンナローション■	ブライル20α			
		トラットローション				

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

みずむし・たむし用薬1

販売名	ヒフルTL水虫液α	ヒフルTL水虫クリームα	ヒフル水虫クリーALC	エフケンクリーム■	ヒフルV8水虫液■	ヒフルV8水虫クリーム■	バンキーU10クリーム
リスク分類	②	②	②	3	②	②	②
性状	液	クリーム	クリーム	クリーム	液	クリーム	クリーム
成分分量	100mL中 テルビナフィン塩酸塩 1.0g リドカイン 2.0g グリチルレチン酸 0.5g クロタミン 5.0g イソプロピルメチルフェノール 0.3g I-メントール 2.0g	100g中 テルビナフィン塩酸塩 1.0g リドカイン 2.0g グリチルレチン酸 0.5g クロタミン 5.0g イソプロピルメチルフェノール 0.3g I-メントール 2.0g 尿素 5.0g	100g中 ラノコナゾール 1.0g ジフェンヒドラミン塩酸塩 2.0g クロタミン 5.0g アラントイン 1.0g	100g中 ウンデシレン酸 3.0g サリチル酸 4.0g 尿素 10.0g	100mL中 ブテナフィン塩酸塩 1.0g リドカイン 2.0g グリチルレチン酸 0.5g クロタミン 5.0g dl-カンフル 1.0g	100g中 ブテナフィン塩酸塩 1.0g リドカイン 2.0g グリチルレチン酸 0.5g クロタミン 5.0g dl-カンフル 1.0g	100g中 テルビナフィン塩酸塩 1.0g 尿素 10.0g リドカイン 2.0g グリチルレチン酸 0.5g クロタミン 5.0g ジフェンヒドラミン 1.0g グリチルレチン酸 0.1g
効能効果	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	水虫、いんきんたむし、ぜにたむし
用法用量	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。
承認日	平成30年4月6日	平成30年4月6日	平成30年3月15日	平成29年4月28日	平成27年4月28日	平成27年4月28日	平成26年2月28日
一物多名称	エフルTL水虫液α オノフェTL水虫液α	エフルTL水虫クリームα オノフェTL水虫クリームα	エフル水虫クリームLC	ヒフル水虫クリーム	エフルV8水虫液■ オノフェV8水虫液■ ラウマーバス水虫液■ ラホヤV8水虫液■ キルカミンV8水虫液■ バンキーV8水虫液 アージュV8水虫液	エフルV8水虫クリーム■ オノフェV8水虫クリーム■ ラウマーバス水虫クリーム■ ラホヤV8水虫クリーム■ キルカミンV8水虫クリーム■ バンキーV8水虫クリーム アージュV8水虫クリーム	エフルU10クリーム■ オノフェU10クリーム■ ラウマ-U10クリーム■ ラホヤU10クリーム■ キルカミンU10クリーム■ ラバルソU10クリーム■ バンキーU10クリーム■ アージュU10クリーム

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

みずむし・たむし用薬2

販売名	ヒフルV7水虫クリーム■	ヒフルV7水虫液■	ヒフルV水虫クリーム	ヒフルV水虫液	キンメルBTクリーム■	キンメルBT液■	ヒフルB水虫スプレー
リスク分類	②	②	②	②	②	②	②
性状	クリーム	液	クリーム	液	クリーム	液	スプレー
成分分量	100g中 ブテナフイン塩酸塩 1.0g リドカイン 2.0g グリチルレチン酸 0.2g クロタミン 3.0g dl-カンフル 1.0g イソプロピルメチルフェノール 0.3g クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.5g	100mL中 ブテナフイン塩酸塩 1.0g リドカイン 2.0g グリチルレチン酸 0.2g クロタミン 3.0g dl-カンフル 1.0g イソプロピルメチルフェノール 0.3g クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.5g	100g中 ブテナフイン塩酸塩 1.0g リドカイン 2.0g グリチルレチン酸 0.2g クロタミン 3.0g dl-カンフル 1.0g イソプロピルメチルフェノール 0.3g クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.5g	100mL中 ブテナフイン塩酸塩 1.0g リドカイン 2.0g グリチルレチン酸 0.5g クロタミン 5.0g dl-カンフル 1.0g	100g中 ブテナフイン塩酸塩 1.0g	100mL中 ブテナフイン塩酸塩 1.0g	100mL中 ブテナフイン塩酸塩 1.0g
効能効果	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし
用法用量	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。
承認日	平成25年4月5日	平成25年3月27日	平成21年3月4日	平成21年3月4日	平成19年3月16日	平成19年3月16日	H18.8.10申請
一物多名称	エフルV7水虫クリーム	エフルV7水虫液	エフルV水虫クリーム	エフルV水虫液	ヒフルB水虫クリーム■	ヒフルB水虫液■	
	オノフェV7水虫クリーム■	オノフェV7水虫液■	オノフェV水虫クリーム■	オノフェV水虫液■	エフルB水虫クリーム	エフルB水虫液	
	ラウマーV7水虫クリーム■	ラウマーV7水虫液■	ラウマーV水虫クリーム■	ラウマーV水虫液■	オノフェB水虫クリーム■	オノフェB水虫液■	
	ラホヤV7水虫クリーム	ラホヤV7水虫液	ラホヤV水虫クリーム■	ラホヤV水虫液■	ラウマーB水虫クリーム	ラウマーB水虫液	
	キルガミンV7水虫クリーム■	キルガミンV7水虫液■	キルガミンV水虫クリーム■	キルガミンV水虫液■	デオブランカB水虫クリーム	デオブランカB水虫液	
					ラホヤB水虫クリーム■	ラホヤB水虫液■	
					ラカナウB水虫クリーム	ラカナウB水虫液	
					キルガミンB水虫クリーム	キルガミンB水虫液	

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

みずむし・たむし用薬3

販売名	ヒールTL水虫クリーム	ヒールTL水虫液	ヒールTL水虫スプレー	ユンカーケリームA■	ユンカーカー液A■	バイエック水虫スプレーTF■	ヒールLAクリーム
リスク分類	②	②	②	②	②	②	②
性状	クリーム	液	スプレー	クリーム	液	スプレー	クリーム
成分分量	100g中 テルビナフィン塩酸塩 1.0g リトカイン 2.0g	100mL中 テルビナフィン塩酸塩 1.0g リトカイン 2.0g	100mL中 テルビナフィン塩酸塩 1.0g リトカイン 2.0g	100g中 テルビナフィン塩酸塩 1.0g	100mL中 テルビナフィン塩酸塩 1.0g	100g中 テルビナフィン塩酸塩 1.0g	100g中 ラノコナゾール 1.0g
効能効果	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし
用法用量	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に噴霧する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に噴霧する。	1日1回、適量を患部に塗布する。
承認日	平成20年3月28日	平成20年3月28日	H19.6.29申請	平成19年4月4日	平成19年4月4日	H18.3.27申請	平成23年4月11日
一物多名称	エプールTL水虫クリーム	エプールTL水虫液	エプールTL水虫スプレー	ヒールT水虫クリーム■	ヒールT水虫液■		エプールLAクリーム
	オノフェTL水虫クリーム	オノフェTL水虫液	オノフェTL水虫スプレー	エプールT水虫クリーム■	エプールT水虫液■		オノフェLAクリーム
	ラウマ-TL水虫クリーム	ラウマ-TL水虫液	ラウマ-TL水虫スプレー	オノフェT水虫クリーム■	オノフェT水虫液■		キルガミンLAクリーム
	デオブランカTL水虫クリーム	デオブランカTL水虫液	デオブランカTL水虫スプレー	ラウマ-T水虫クリーム	ラウマ-T水虫液		
	ラホヤTL水虫クリーム	ラホヤTL水虫液	ラホヤTL水虫スプレー	デオブランカT水虫クリーム	デオブランカT水虫液		
	ラカナウTL水虫クリーム	ラカナウTL水虫液	ラカナウTL水虫スプレー	ラホヤT水虫クリーム	ラホヤT水虫液		
	キルガミンTL水虫クリーム	キルガミンTL水虫液	キルガミンTL水虫スプレー	ラカナウT水虫クリーム	ラカナウT水虫液		
				キルガミンT水虫クリーム	キルガミンT水虫液		

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

みずむし・たむし用薬4

販売名	ヒールLA液	ヒールL水虫クリーム	ヒールL水虫液	キンメルLクリーム■	キンメルL液■	キンメルLスプレー■	ハド・スキン水虫チンキ■	
リスク分類	②	2	2	2	2	2	2	
性状	液	クリーム	液	クリーム	液	スプレー	淡黄色澄明液体	
成分分量	100mL中 ラノナゾール 1.0g ジ'フェンヒド'ラミン塩酸塩 0.5g グリチルレチン酸 0.5g ベンザルコニウム塩化物 0.05g I-メントール 2.0g	100g中 ビ'ホナゾール 1.0g リトカイン 2.0g ジ'フェンヒド'ラミン塩酸塩 0.5g グリチルレチン酸 0.5g ベンザルコニウム塩化物 0.05g I-メントール 2.0g	100mL中 ビ'ホナゾール 1.0g リトカイン 2.0g ジ'フェンヒド'ラミン塩酸塩 0.5g グリチルレチン酸 0.5g ベンザルコニウム塩化物 0.05g 尿素 3.0g	100g中 ミコナゾール硝酸塩 1.0g クロタミン 10.0g リトカイン 2.0g グリチルリチン酸二カリウム 0.5g I-メントール 1.0g	100mL中 ミコナゾール硝酸塩 1.0g クロタミン 10.0g リトカイン 2.0g グリチルリチン酸二カリウム 0.5g I-メントール 1.0g	100mL中 ミコナゾール硝酸塩 1.0g クロタミン 10.0g リトカイン 2.0g グリチルリチン酸二カリウム 0.5g I-メントール 1.0g	100mL中 クロトリマゾール 1.0g グリチルレチン酸 0.2g ジ'フェンヒド'ラミン塩酸塩 0.5g ムクゲ'皮 12.0ml 尿素 5.0g	
効能効果	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	水虫、いんきんたむし、ぜにたむし	水虫、いんきんたむし、ぜにたむし	水虫、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	
用法用量	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1～2回、適量を患部に塗布する。	1日1～2回、適量を患部に塗布する。	1日1～2回、適量を患部に噴霧する。	1日2～3回、適量を患部に塗布する。	
承認日	平成23年4月11日	平成17年6月15日	平成26年8月18日	平成15年1月30日	平成15年1月30日	平成15年1月30日	平成14年1月31日	
一物多名称	エプールLA液 オノフェLA液 キルカミンLA液	ラウマーレ水虫クリーム オノフェL水虫クリーム エフカイL水虫クリーム シンタコL水虫クリーム エプールL水虫クリーム	ラウマーレ水虫液 オノフェL水虫液 エフカイL水虫液 シンタコL水虫液 エプールL水虫液	ローレンミコナクリーム■ ヒール水虫クリームMC■ エフカイL水虫クリームMC オノフェ水虫クリームMC エプールL水虫クリームMC	ローレンミコナ液■ ヒール水虫液MC■ エフカイL水虫液MC オノフェ水虫液MC エプールL水虫液MC			

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

みずむし・たむし用薬5

販売名	ハイドロキン水虫軟膏■	ローレンクロマクリーム■	ローレンクロマ液■	ダニヤ水虫軟膏■	スーパー・ローレン液	ダニヤ水虫液■	新ローレン液
リスク分類	2	2	2	3	2	2	2
性状	淡黄色ゲル状軟膏	白色のクリーム	芳香の無色透明の液	芳香の白色軟膏	芳香の淡黄色透明の液	芳香の透明無色の液	芳香の淡黄褐色の液
成分分量	100g中 クロトリマゾール 1.0g グリチルレチン酸 0.2g ジフェンヒドラミン 0.5g ムクゲ皮 12.0ml	100g中 クロトリマゾール 1.0g クロダミン 5.0g リトカイン 2.0g グリチルレチン酸 0.5g	100ml中 クロトリマゾール 1.0g クロダミン 5.0g リトカイン 2.0g グリチルレチン酸 0.5g	100g中 ジフェンヒドラミン 0.5g ウンデシレン酸 3.0g ウンデシレン酸亜鉛 5.0g グリチルレチン酸 0.5g	100ml中 トルナフテート 1.0g ウンデシレン酸 3.0g サリチル酸 2.0g ジブカイン塩酸塩 0.2g グリチルレチン酸 0.2g	100ml中 トルナフテート 1.0g ウンデシレン酸 3.0g サリチル酸 2.0g ジブカイン塩酸塩 0.2g グリチルレチン酸 0.2g	100ml中 チアントール 12.0g トルナフテート 2.0g グリチルレチン酸 0.2g
効能効果	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	水虫、ぜにたむし、いんきんたむし	水虫、ぜにたむし、いんきんたむし	水虫、ぜにたむし、いんきんたむし	水虫、いんきんたむし、ぜにたむし
用法用量	1日2~3回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回患部に塗布または塗擦する。	1日2~3回患部に塗布する。	1日2~3回患部に塗布する。	1日2~3回患部に塗布する。
承認日	平成14年1月31日	平成2年4月18日	平成2年2月13日	昭和62年4月15日	昭和61年10月22日	昭和61年8月27日	昭和59年9月7日
一物多名称				スーパー・ローレン軟膏		カイザーリー液	

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

みずむし・たむし用薬6

販売名	新ローレン軟膏	デルムSパウダー	ローレンパールクリーム	ローレンパール軟膏	ローレンゴールド軟膏	ローレンゴールド液	ローレンローション
リスク分類	2	2	2	2	3	2	2
性状	芳香の淡黄褐色の軟膏	白色の散剤	淡黄色クリーム状軟膏	特異臭の白色軟膏	芳香の淡黄色軟膏	黄色透明芳香の液体	淡黄色透明芳香の液体
成分分量	100g中 チアントール 12.0g トルナフテート 2.0g ケリチルレチン酸 0.5g	100g中 ウンデシレン酸亜鉛 10.0g サリチル酸ジフェニヒドラミン 0.8g クロルヘキシジン塩酸塩 0.2g	100g中 チアントール 8.0g サリチル酸 3.0g テシット・デシチン 0.5g ケリチルリチン酸ジカリウム 0.5g	100g中 チアントール 10.0g 酸化亜鉛 10.0g テシット・デシチン 1.0g ケリチルリチン酸ジカリウム 1.0g	100g中 チアントール 8.0g イソプロピルメチルフェノール 3.0g テカリニウム塩化物 0.3g ジフェニヒドラミン 1.0g	100mL中 チアントール 10.0g サリチル酸 8.0g クロロブタノール 1.0g トメントール 0.2g カンフル 0.1g アマニ油 1.0g ロジン 0.5g	100mL中 ウンデシレン酸 5.0g サリチル酸 8.0g β -ケリチルレチン酸 0.05g 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン液 0.1g
効能効果	水虫、ぜにたむし、いんきんたむし	水虫、ぜにたむし、いんきん、たむし、はたけ、しらくも	みずむし、たむし、ぜにたむし、かいせん、しらくも	みずむし、たむし、ぜにたむし、かいせん	水虫、ぜにたむし、いんきん、たむし、しらくも	水虫、いんきんたむし、疥癬、乾癬、これらに起因する皮膚そう痒症	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし
用法用量	1日2~3回患部に塗布又は塗擦する。	患部を清潔にした後、1日数回ふりかけてすり込む。予防には入浴後手足の指等にふりかけるか靴下の内部に散布する。	1日2~3回、患部を清潔にしたのち、適量を患部に十分にすり込む。	1日2~3回、患部を清潔にしたのち、適量を患部に十分にすり込む。または清潔な布、ガーゼにのばして患部に貼布する。	1日2~3回患部に塗布する。	1日数回、適宜量を患部に塗布する。	1日数回脱脂綿またはガーゼに浸して患部に塗布または清拭する。
承認日	昭和58年11月11日	昭和53年6月26日	昭和49年2月16日	昭和49年2月16日	昭和44年8月28日	昭和39年8月18日	昭和39年4月22日

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

外用鎮痛消炎薬1

販売名	ロキアージュG2	ロキアージュL2■	ロキアージュG	ロキアージュL	ロキアージュC■	ヒフルFE液α■	ヒフルFEゲルα
リスク分類	2	2	2	2	2	2	2
性状	水性ゲル剤	ローション剤	水性ゲル剤	ローション剤	o/w型クリーム剤	ローション剤	水性ゲル剤
成分分量	100g中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 1.13g I-メントール 3.0g	100g中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 1.13g I-メントール 3.0g	100g中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 1.13g	100g中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 1.13g	100g中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 1.13g	100ml中 フェルビ'ナク 3.0g I-メントール 6.0g クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.1g ノナン酸バニリルアミド 12.0mg	100g中 フェルビ'ナク 3.0g I-メントール 6.0g クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.1g ノナン酸バニリルアミド 12.0mg
効能効果	関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)	関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)	関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)	関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)	関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)	肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫	筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛(五十肩など)、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲(うちみ)、捻挫
用法用量	1日3~4回、適量を患部に塗擦する。	1日3~4回、適量を患部に塗布する。	1日3~4回、適量を患部に塗擦する。	1日3~4回、適量を患部に塗擦する。	1日3~4回、適量を患部に塗擦する。	1日2~4回、適量を患部に塗布する。	1日2~4回、適量を患部に塗擦する。
承認日	2022/10/4申請	令和5年5月19日	令和4年5月11日	令和4年5月11日	令和4年5月11日	令和3年2月5日	2021/7/21申請
一物多名称	ロキエフルG2■ ロキオノフエG2 ロキトラット'G2	ロキエフルL2■ ロキオノフエL2 ロキトラット'L2	ロキエフルG■ ロキオノフエG ロキトラット'G■	ロキエフルL■ ロキオノフエL ロキトラット'L■	ロキエフルC ロキオノフエ ロキトラット'L■	エフルFE液α オノフエ液α	エフルFEゲルα オノフエゲルα

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

外用鎮痛消炎薬2

販売名	ヒールZX液■	ヒールZXゲル	ヒールZ液	ヒールZゲル	ヒールFEゲル3■	ヒールFE液2■	エプールFEゲル2■
リスク分類	2	2	2	2	2	2	2
性状	液	ゲル	液	ゲル	ゲル	液	ゲル
成分分量	100g中 ジクロフェナカナトリウム 1.0g I-メントール 3.0g	100g中 ジクロフェナカナトリウム 1.0g I-メントール 3.0g	100g中 ジクロフェナカナトリウム 1.0g	100g中 ジクロフェナカナトリウム 1.0g	100g中 フェルビ'ナク 3.0g I-メントール 6.0g クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.1g	100ml中 フェルビ'ナク 3.0g I-メントール 6.0g クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.1g	100g中 フェルビ'ナク 3.0g I-メントール 3.0g
効能効果	腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫	腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫	関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫	関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫	肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、関節痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫	肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、関節痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫	肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)
用法用量	1日3~4回適量を患部に塗布してください。ただし、塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。	1日3~4回適量を患部に塗擦してください。ただし、塗擦部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。	1日3~4回適量を患部に塗布してください。ただし、塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。	1日3~4回適量を患部に塗布してください。ただし、塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。	1日2~4回、適量を患部に塗擦する。	1日2~4回、適量を患部に塗布する。	1日2~4回、適量を患部に塗擦する。
承認日	平成27年10月16日	平成27年10月16日	平成26年10月16日	平成26年10月16日	平成25年11月29日	平成24年3月5日	平成22年3月9日
一物多名称	エプールZX液	エプールZXゲル	エプールZ液	エプールZゲル	エプールFEゲル3■	エプールFE液2	オノフェFEゲル2
	オノフェZX液	オノフェZXゲル	オノフェZ液	オノフェZゲル	オノフェFEゲル3■	オノフェFE液2■	ラウマーFEゲル2
	ラウマーZX液	ラウマーZXゲル	ラウマーZ液	ラウマーブゲル	ラウマーFEゲル3	ラウマーFE液2	キルカミンFEゲル2
	ラホヤZX液	ラホヤZXゲル	ラホヤZ液	ラホヤZゲル	キルカミンFEゲル3	キルカミンFE液2	ヒフルFEゲル2
	キルカミンZX液	キルカミンZXゲル	キルカミンZ液	キルカミンZゲル			シンタコFEゲル2
	ラバ'ルンZX液	ラバ'ルンZXゲル	ラバ'ルンZ液	ラバ'ルンZゲル			ラホヤFEゲル2
							トロマFEゲル2
							エフカイFEゲル2

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

外用鎮痛消炎薬3

販売名	ヒフルFE液	ヒフルFEゲル	ヒフルメタシン1.0%液	ヒフルメタシン1.0%ゲル	ラカナウ アロメタシンL	ラカナウ アロメタシンE	アリサメタシン液
リスク分類	2	2	2	2	2	2	2
性状	液	ゲル	液	ゲル	クリーム	クリーム	芳香の淡黄色澄明の液
成分分量	100ml中 フェルビ'ナク 3.0g I-メントール 3.0g	100g中 フェルビ'ナク 3.0g	100ml中 イントメタシン 1.0g I-メントール 3.0g	100g中 イントメタシン 1.0g I-メントール 3.0g	100g中 イントメタシン 1.0g ※ラベンダーの香り	100g中 イントメタシン 1.0g ※ユーカリの香り	100ml中 イントメタシン 0.75g I-メントール 1.0g
効能効果	肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、関節痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫	筋肉痛、腰痛、関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫	筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫	筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫	肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫	肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫	筋肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫
用法用量	1日2~4回、適量を患部に塗布する。	1日2~4回、適量を患部に塗擦する。	1日4回を限度として適量を患部に塗布する。	1日4回を限度として適量を患部に塗布する。	1日4回を限度として適量を患部に塗擦する。	1日4回を限度として適量を患部に塗擦する。	1日4回を限度として適量を患部に塗布する。
承認日	平成20年3月15日	平成20年9月9日	平成17年6月15日	平成26年7月31日	平成22年12月13日	平成22年12月13日	平成5年1月28日
一物多名称	エフルFE液	エフルFEゲル	ラウマーメタシン1.0%液	ラウマーメタシン1.0%ゲル	キルカミン アロメタシンL	キルカミン アロメタシンE	タンタンメタシン液
	オノフェFE液	オノフェFEゲル	オノフェメタシン1.0%液	オノフェメタシン1.0%ゲル			
	ラウマーフE液■	ラウマーフEゲル	エフカイメタシン1.0%液	エフカイメタシン1.0%ゲル			
	キルカミンFE液■	キルカミンFEゲル	シンタコメタシン1.0%液	シンタコメタシン1.0%ゲル			
	ラホヤFE液	シンタコFEゲル	エフルメタシン1.0%液	エフルメタシン1.0%ゲル			
	トロマFE液	ラホヤFEゲル					
	エフカイFE液	トロマFEゲル					
	デオブランカFE液	エフカイFEゲル					
		デオブランカFEゲル					

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

外用鎮痒消炎薬1

販売名	ヒフルER液■	ヒフルER軟膏■	ヒフルHD	ヒフルHDスプレー	エフルVZ■	エフルVZクール■
リスク分類	②	②	②	②	2	2
性状	外用液剤	油脂性軟膏剤	外用液剤	ポンプスプレー剤	o/w型クリーム剤	o/w型クリーム剤
	100mL中	100g中	100mL中	100mL中	100g中	100g中
成分分量	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g ジフェンヒドラミン塩酸塩 2.0g グリチルリチン酸二カリウム 0.3g I-メントール 1.0g	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g ジフェンヒドラミン塩酸塩 1.0g グリチルリチン酸 0.3g I-メントール 1.0g トコフェロール酢酸エステル 0.5g	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g ジフェンヒドラミン塩酸塩 2.0g グリチルリチン酸二カリウム 1.0g アラントイン 0.2g イソプロピルメチルフェノール 0.5g リトカイン 2.0g I-メントール 3.5g	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g ジフェンヒドラミン塩酸塩 2.0g グリチルリチン酸二カリウム 1.0g アラントイン 0.2g イソプロピルメチルフェノール 0.5g リトカイン 2.0g I-メントール 3.5g	ジフェンヒドラミン塩酸塩 2.0g グリチルリチン酸 1.0g イソプロピルメチルフェノール 0.5g リトカイン 2.0g トコフェロール酢酸エステル 2.0g	ジフェンヒドラミン塩酸塩 2.0g グリチルリチン酸 1.0g イソプロピルメチルフェノール 0.5g リトカイン 2.0g トコフェロール酢酸エステル 2.0g I-メントール 0.5g
効能効果	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん
用法用量	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に噴霧する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。
承認日	令和4年7月11日	令和5年3月31日	令和3年8月23日	2020/12/23申請	令和3年6月16日	令和3年6月16日
一物多名称	エフルER液■ オノフェER液	エフルER軟膏 オノフェER軟膏	エフルHD オノフェHD	エフルHDスプレー	ヒフルVZ キルカミンVZ	エカイVZクール ヒフルVZクール
	エカイER軟膏	エカイHD			バンキーVZ	ラホヤVZクール
	ミニソ軟膏	ヒフルER液プラス■				オノフェVZクール

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

外用鎮痒消炎薬2

販売名	ヒフルPVA11液■	ヒフルPVA11ゲル■	ヒフルPVA9液	ヒフルPVA9ゲル	ヒフルPVA8軟膏■	ヒフルPVA8クリーム■
リスク分類	②	②	②	②	②	②
性状	液	ゲル	液	ゲル	軟膏	クリーム
成分分量	100mL中 プレドニゾロン吉草酸エステル 酢酸エステル 0.15g ジフェンヒドラミン塩酸塩 クロタミン グリチルリチン酸二カリウム I-メントール dl-カンフル リトカイン イソプロピルメチルフェノール パンテノール サリチル酸グリコール トコフェロール酢酸エステル 0.1g	100g中 プレドニゾロン吉草酸エステル 酢酸エステル 0.15g ジフェンヒドラミン塩酸塩 クロタミン グリチルリチン酸二カリウム I-メントール dl-カンフル リトカイン イソプロピルメチルフェノール パンテノール サリチル酸グリコール トコフェロール酢酸エステル 0.1g	100mL中 プレドニゾロン吉草酸エステル 酢酸エステル 0.15g ジフェンヒドラミン塩酸塩 クロタミン グリチルリチン酸二カリウム I-メントール dl-カンフル リトカイン イソプロピルメチルフェノール パンテノール サリチル酸グリコール トコフェロール酢酸エステル 0.1g	100g中 プレドニゾロン吉草酸エステル 酢酸エステル 0.15g ジフェンヒドラミン塩酸塩 クロタミン グリチルリチン酸二カリウム I-メントール dl-カンフル リトカイン イソプロピルメチルフェノール パンテノール サリチル酸グリコール トコフェロール酢酸エステル 0.1g	100g中 プレドニゾロン吉草酸エステル 酢酸エステル 0.15g ジフェンヒドラミン塩酸塩 クロタミン トコフェロール酢酸エステル グリチルリチン酸 アラントイン リトカイン イソプロピルメチルフェノール 0.1g	100g中 プレドニゾロン吉草酸エステル 酢酸エステル 0.15g ジフェンヒドラミン塩酸塩 クロタミン トコフェロール酢酸エステル グリチルリチン酸 アラントイン リトカイン イソプロピルメチルフェノール 0.1g
効能効果	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん
用法用量	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗擦する。	1日数回、適量を患部に塗擦する。
承認日	平成29年9月29日	平成29年9月29日	平成26年2月24日	平成26年2月24日	平成26年9月29日	平成26年9月29日
一物多名称	ラウマ-PVA11液■	ラウマ-PVA11ゲル	ラウマ-PVA9液	ラウマ-PVA9ゲル	ラウマ-PVA8軟膏■	ラウマ-PVA8クリーム■
	ラホヤPVA11液■	ラホヤPVA11ゲル■	ラホヤPVA9液■	ラホヤPVA9ゲル■	ラホヤPVA8軟膏	ラホヤPVA8クリーム■
	エプールPVA11液■	エプールPVA11ゲル	エプールPVA9液■	エプールPVA9ゲル■	エフカイPVA8軟膏	エフカイPVA8クリーム
	バンキ-PVA11液■	バンキ-PVA11ゲル■	オノフェPVA9液	オノフェPVA9ゲル	オノフェPVA8軟膏	オノフェPVA8クリーム
	バンパスPVA11液■	バンパスPVA11ゲル■	エフカイPVA9液	エフカイPVA9ゲル	ラカナウPVA8軟膏■	ラカナウPVA8クリーム■
	オノフェPVA11液	オノフェPVA11ゲル	バンキ-PVA9液	バンキ-PVA9ゲル	キルカミンPVA8軟膏	キルカミンPVA8クリーム
	エフカイPVA11液	エフカイPVA11ゲル	バンパスPVA9液■	バンパスPVA9ゲル■	デオブランカPVA8軟膏	デオブランカPVA8クリーム
			ナルガPVA9液	ナルガPVA9ゲル	エプールPVA8軟膏	エプールPVA8クリーム
					ラハルンPVA8軟膏■	ラハルンPVA8クリーム■
					ナルガPVA8クリーム	

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

外用鎮痒消炎薬3

販売名	ヒールEX液 α ■	ヒールEX液プラス	ヒールEXゲル ■	ヒールEXクリーム ■	ヒールEX液 ■	エプールD軟膏	エプールDクリーム
リスク分類	②	②	②	②	②	②	②
性状	液	液	ゲル	クリーム	液	軟膏	クリーム
成分分量	100ml中 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g ジフェンヒドラミン塩酸塩 2.0g クロタミン 3.0g ケリチルリチン酸二カリウム 0.2g イメントール 3.5g リトカイン 1.0g イソプロピルメチルフェノール 0.1g アラントイン 0.2g	100ml中 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g ジフェンヒドラミン塩酸塩 2.0g クロタミン 5.0g イメントール 1.5g リトカイン 1.5g イソプロピルメチルフェノール 0.1g アラントイン 0.2g	100g中 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g ジフェンヒドラミン塩酸塩 1.0g クロタミン 5.0g イメントール 3.5g dl-カンフル 1.0g クロタミン 5.0g イソプロピルメチルフェノール 0.1g	100g中 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g ジフェンヒドラミン塩酸塩 1.0g クロタミン 5.0g イメントール 3.5g dl-カンフル 1.0g クロタミン 5.0g イソプロピルメチルフェノール 0.1g	100ml中 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g クロタミン 5.0g トコフェロール酢酸エステル 0.5g イソプロピルメチルフェノール 0.1g	100g中 ヒドロコルチゾン酢酸エステル 0.05g クロタミン 5.0g トコフェロール酢酸エステル 0.5g イソプロピルメチルフェノール 0.1g	100g中 ヒドロコルチゾン酢酸エステル 0.05g クロタミン 5.0g トコフェロール酢酸エステル 0.5g イソプロピルメチルフェノール 0.1g
効能効果	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん	虫さされ、かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、じんましん、あせも	虫さされ、かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、じんましん、あせも	虫さされ、かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、じんましん、あせも	湿疹、皮膚炎、かぶれ、かゆみ、虫さされ、あせも、ただれ、じんましん	湿疹、皮膚炎、かぶれ、かゆみ、虫さされ、あせも、じんましん
用法用量	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。
承認日	平成27年2月20日	平成26年9月8日申請	平成23年1月28日	平成26年12月18日	平成21年2月9日	平成17年11月8日	平成17年11月8日
一物多名称	ラウマーEX液 α ■	エプールEX液プラス	ラウマーEXゲル	ラウマーEXクリーム ■	ラウマーEX液	ヒールD軟膏	ヒールDクリーム
	ラホヤEX液 α		ラホヤEXゲル ■	ラホヤEXクリーム	ラホヤEX液 ■	エカイD軟膏	エカイDクリーム
	エプールEX液 α		ラカナウEXゲル	ラカナウEXクリーム	ラカナウEX液	オノフェD軟膏	オノフェDクリーム
	オノフェEX液 α		キルカミンEXゲル	キルカミンEXクリーム	キルカミンEX液 ■		
	キルカミンEX液 α ■		デオブランカEXゲル	デオブランカEXクリーム	デオブランカEX液 ■		
	デオブランカEX液 α ■		エプールEXゲル ■	エプールEXクリーム	エプールEX液 ■		
	エカイEX液 α ■				オノフェEX液		
	バンキーEX液 α ■				シンタコEX液		
					トロマEX液		
					エカイEX液		
					バンキーEX液 ■		

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

外用鎮痒消炎薬4

販売名	キルガミンα■	キルガミンα液	オノフェS■	オノフェSP	パンパストクリーム	パンパスト軟膏	ペレトンアルファ2
リスク分類	②	②	2	2	②	②	②
性状	クリーム	液	クリーム	液	クリーム	軟膏	クリーム
成分分量	100g中 テ'キサメタゾン酢酸エステル 0.025g ジ'フェンヒド'ラミン塩酸塩 1.0g I-メントール 3.5g dl-カンフル 1.0g クロタミン 5.0g イソプロピルメチルフェノール 0.1g	100ml中 テ'キサメタゾン酢酸エステル 0.025g ジ'フェンヒド'ラミン塩酸塩 1.0g I-メントール 3.0g dl-カンフル 2.0g イソプロピルメチルフェノール 0.1g	100g中 リトカイン 2.0g トコフェロール酢酸エステル 0.3g ジ'フェンヒド'ラミン塩酸塩 2.0g シ'フェンヒド'ラミン塩酸塩 2.0g ベンセトニウム塩化物 0.1g	100g中 ジ'ブ'カイン塩酸塩 0.3g トコフェロール酢酸エステル 0.15g クロタミン 5.0g トコフェロール酢酸エステル 0.5g イソプロピルメチルフェノール 0.1g	100g中 ブレド'ニゾ'ロン吉草酸エステル 酢酸エステル 0.15g クロタミン 5.0g トコフェロール酢酸エステル 0.5g イソプロピルメチルフェノール 0.1g	100g中 ブレド'ニゾ'ロン吉草酸エステル 酢酸エステル 0.15g クロタミン 5.0g トコフェロール酢酸エステル 0.5g イソプロピルメチルフェノール 0.1g	100g中 テ'キサメタゾン酢酸エステル 0.025g ジ'ブ'カイン塩酸塩 0.3g ジ'フェンヒド'ラミン塩酸塩 0.5g ケリチルレチン酸 0.5g サリチル酸メチル 2.5g I-メントール 1.0g dl-カンフル 1.5g
効能効果	かゆみ、湿疹、虫さされ、皮膚炎、かぶれ、じんましん、あせも、しもやけ	かゆみ、虫さされ、かぶれ、あせも、じんましん、湿疹、皮膚炎、しもやけ	かゆみ、かぶれ、湿疹、虫さされ、皮膚炎、じんましん、あせも、ただれ、しもやけ	かゆみ、かぶれ、湿疹、虫さされ、皮膚炎、じんましん、あせも、ただれ、しもやけ	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん
用法用量	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、患部に適量を塗布する。	1日数回、患部に適量を塗布(噴霧)する。	1日数回、適量を患部に塗擦する。	1日数回、適量を患部に塗擦する。	1日数回、適量を患部に塗布する。
承認日	平成17年6月23日	平成17年6月23日	平成16年10月5日	平成26年7月31日	平成15年3月3日	平成15年3月3日	平成14年5月22日
一物多名称	エ'プ'ールα	エ'プ'ールα液■	ラウマ-S■	エ'プ'ールSP	ヒ'フルTクリーム■	ヒ'フルT軟膏■	パン'パ'スD
	ノリアスα■	ノリアスα液	エ'プ'ールS■	ラウマ-SP	ア'ージュTクリーム	ラウマ-T軟膏	ヒ'フルA
	ラウマ-α	ラウマ-α液	キルガミンS■	キルガミンSP	ラウマ-Tクリーム	ラホヤT軟膏	マンナクリーム
	オノフェα■	オノフェα液	エトラスα■	テ'オ'ブ'ランカSP	ラホヤTクリーム	オノフェT軟膏	
	エ'カイα■	エ'カイα液■	テ'オ'ブ'ランカS■		オノフェTクリーム	キルガミンT軟膏	
	ラホヤα	ラホヤα液	ラカナウS■		キルガミンTクリーム	エ'カイT軟膏■	
	ペ'レトンアルファEX		ラホヤS		エ'カイTクリーム■		
			エ'カイS		エ'カイTクリーム■		
			シンタコS				

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

外用鎮痒消炎薬5

販売名	ボルネオキサゲル	ペレトンアルファ■	パルムローション	エクセムA	マリンボルネ	ボルネオワイト	アセモヒール■
リスク分類	②	②	2	②	②	②	2
性状	無色透明のゲル	芳香の白色クリーム	芳香の乳白色乳液	白色軟膏	芳香の淡青白色乳液	芳香の白色軟膏	軟膏
成分分量	100g中 テ'キサメタゾン酢酸エステル 0.025g クロタミン 5.0g イソプロピルメチルフェノール 0.1g	100g中 テ'キサメタゾン酢酸エステル 0.025g ジ'フ'カイン塩酸塩 0.3g ジ'フェンヒド'ラミン 0.5g グリチルレチン酸 0.5g イソプロピルメチルフェノール 0.1g サリチル酸メチル 2.5g I-メントール 1.0g dl-カンフル 1.5g	100g中 ジ'フ'カイン塩酸塩 0.3g ジ'フェンヒド'ラミン 1.0g グリチルレチン酸 0.2g イソプロピルメチルフェノール 0.1g クロルヘキシジン塩酸塩 0.2g アラントイン 0.2g	100g中 ヒト'コロルチゾン酢酸エステル 0.5g ジ'フェンヒド'ラミン塩酸塩 0.5g グリチルレチン酸 0.5g イソプロピルメチルフェノール 0.1g 酸化亜鉛 2.0g	100g中 テ'キサメタゾン酢酸エステル 0.025g 酸化亜鉛 1.5g グリチルレチン酸 0.3g イソプロピルメチルフェノール 0.1g	100g中 テ'キサメタゾン酢酸エステル 0.025g ジ'フェンヒド'ラミン 0.5g グリチルレチン酸 0.3g 酸化亜鉛 10.0g	100g中 酸化亜鉛 20.0g ジ'フェンヒド'ラミン 1.0g リドカイン 1.0g グリチルレチン酸 0.2g アラントイン 0.5g イソプロピルメチルフェノール 0.1g トコフェロール酢酸エステル 1.0g ハッカ油 0.5g
効能効果	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん
用法用量	1日2~3回、適量を患部に塗布または塗擦する。	1日数回、適量を患部に塗布または塗擦する。	1日数回塗布又は塗擦する。	1日2~3回患部に塗布する。	1日1~数回患部に塗布または塗擦する。	1日2~3回適量を患部に塗布または塗擦する。	1日数回、適量を患部に塗擦する。
承認日	平成4年11月13日	平成4年1月21日	平成2年10月25日	昭和63年2月8日	昭和62年12月4日	昭和62年12月4日	平成27年3月26日
一物多名称				パ'トロパン'パス			アセモエ'ール■ アセモオ'フェ■ アセモラウ'マー ¹ アセモラホ'ヤ ² アセモバン'キー■ ³

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

外用鎮痒消炎薬6

販売名	アセモタミ■	ヒールUFクリーム■	アセモーマS■	協和アセモ軟膏■	タキヤパンパス軟膏	ペレコーチH軟膏	ペレトンW
リスク分類	②	2	2	②	②	②	2
性状	軟膏	クリーム	白色芳香の軟膏	白色軟膏	芳香の白色軟膏	芳香の白色軟膏	芳香の白色軟膏
成分分量	100g中 ヒドロコルチゾン酢酸エステル 0.5g アミノ安息香酸エチル 2.0g トコフェロール酢酸エステル 0.5g 酸化亜鉛 30.0g	100g中 ウフェナマート 5.0g ジ'フェンヒド'ラミン 1.0g グリチルレチン酸 0.3g トコフェロール酢酸エステル 0.5g ベ'ンセトニウム塩化物 0.1g	100g中 アミノ安息香酸エチル 1.0g 酸化亜鉛 37.0g フェノール 0.5g ジ'フェンヒド'ラミン 1.0g	100g中 ヒドロコルチゾン酢酸エステル 0.2g アミノ安息香酸エチル 0.3g サリチル酸メチル 1.0g クロルヘキシジン塩酸塩 0.1g ジ'フェンヒド'ラミン 0.5g 酸化亜鉛 5.0g	100g中 ヒドロコルチゾン酢酸エステル 0.5g ジ'フェンヒド'ラミン塩酸塩 1.0g グリチルレチン酸 0.5g クロルヘキシジン塩酸塩 0.2g	100g中 ヒドロコルチゾン酢酸エステル 0.5g ジ'フェンヒド'ラミン塩酸塩 1.0g グリチルレチン酸 0.5g クロルヘキシジン塩酸塩 0.2g	100g中 ジ'フェンヒド'ラミン 1.0g グリチルレチン酸 0.5g ジ'カイン塩酸塩 0.3g サリチル酸メチル 4.8g トメントール 4.0g dl-カンフル 3.0g
効能効果	あせも、かぶれ、かゆみ、湿疹、皮膚炎、じんましん、虫さされ、しもやけ	皮膚炎、湿疹、おむつかぶれ、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん	あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、しもやけ、湿疹、皮膚炎、じんましん	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん	かゆみ、かぶれ、虫さされ、じんましん、しもやけ、あせも、ただれ、湿疹
用法用量	1日2~3回、適量を患部に塗擦する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日2~3回、患部に適量を塗布する。	1日2~3回、患部に塗布又は塗擦する。	1日数回患部に塗布または塗擦する。	1日数回患部に塗布または塗擦する。	1日数回、適宜量を患部に塗布するかまたは塗擦する。
承認日	平成3年5月14日	平成27年3月19日	昭和62年4月22日	昭和61年9月25日	昭和61年6月24日	昭和61年5月1日	昭和60年3月30日
一物多名称	エ'ールUFクリーム■ オノフ'ルUFクリーム■ ハ'ンキーUFクリーム■ ラバ'ルンUFクリーム ラウマーUFクリーム■ アージ'ュUFクリーム■ マンナUFクリーム キルガミンUFクリーム						

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

外用鎮痒消炎薬7

販売名	スキンヘルプ [■] (クリーム)	パンパスA軟膏 ^{〔万協〕}	モンルナ100 [■]	ペレトンAクリーム	ニューアセモーション 「万協」	0.5%ブレ'パンパス軟膏 「万協」	0.3%ブレ'パンパス軟膏 「万協」
リスク分類	3	2	②	2	2	②	②
性状	白色軟膏	白色軟膏	淡紅色の懸濁液	芳香の白色軟膏	芳香の淡青白色乳液	白色無臭の軟膏	白色無臭の軟膏
成分分量	100g中 クロタミン 5.0g イソプロピルメチルフェノール 0.5g グリチルレチン酸 1.0g	100g中 グリチルレチン酸 2.0g クロルヘキシジン塩酸塩 0.1g	1,000ml中 テ'キサメタゾン 0.25g カラミン 20.00g グルコン酸クロルヘキシジン液 1.00g	100g中 ジ'ブカイン塩酸塩 0.3g ジ'フェンヒドラン 2.0g テシット・デ'シチン 0.3g サリチル酸メチル 2.0g I-メントール 1.0g カンフル 2.0g	100ml中 酸化亜鉛 1.5g フェノール 0.5g テ'カリニウム塩化物 0.3g テシット・デ'シチン 0.3g グリチルリチン酸ジ'カリウム 0.2g	100g中 ブレドニゾロン 0.5g テ'カリニウム塩化物 0.3g テシット・デ'シチン 0.1g	100g中 ブレドニゾロン 0.3g テ'カリニウム塩化物 0.2g テシット・デ'シチン 0.1g
効能効果	かゆみ、かぶれ、湿疹、虫さされ、じんましん、しもやけ、皮膚炎、あせも、ただれ	湿疹、皮膚炎、かぶれ、じんましん、ただれ	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん	かゆみ、かぶれ、じんましん、虫さされ、接触性皮膚炎	あせも、ただれ、かぶれ、かみそりまけ、虫さされ、あせもに伴う感染症、汗臭の防止	急性慢性湿疹、脂漏性湿疹、小児湿疹、接触性皮膚炎、アビー性皮膚炎、神経性皮膚炎、ストロフルス尋麻疹、皮膚・肛門・陰部そう痒症	急性慢性湿疹、脂漏性湿疹、小児湿疹、接触性皮膚炎、アビー性皮膚炎、神経性皮膚炎、ストロフルス尋麻疹、皮膚・肛門・陰部そう痒症
用法用量	1日数回適量を患部に塗布又は塗擦する。	1日1~2回適量を患部に塗布するか、又はガーゼにのばして貼布する。	使用時によく振り混ぜて、1日2~3適量を患部に塗布する。	1日数回適量を患部に充分すり込む。	1日数回、用時よく振って適當量を患部に塗布する。	1日3~4回少量を患部に軽く塗布する。	1日3~4回少量を患部に軽く塗布する。
承認日	昭和58年8月8日	昭和58年5月26日	昭和45年1月12日	昭和44年8月28日	昭和42年1月30日	昭和39年7月6日	昭和39年7月6日
一物多名称	ラウマーハクリーム エフ'ールハクリーム エフカイハクリーム						

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

外用痔疾用薬1

販売名	レーパンH軟膏Ex α	レーパンH坐剤Ex α ■
リスク分類	②	②
剤型	軟膏	坐剤
成分分量	100g中 プレドニゾロン酢酸エステル 0.1g リトカイン 3.0g イソプロピルメチルフェノール 0.1g クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.2g アラントイン 1.0g グリチルレチン酸 0.3g トコフェロール酢酸エステル 3.0g ラーメントール 0.1g	1個中 プレドニゾロン酢酸エステル 1.0mg リトカイン 60.0mg イソプロピルメチルフェノール 2.0mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 4.0mg アラントイン 20.0mg グリチルレチン酸 6.0mg トコフェロール酢酸エステル 60.0mg ラーメントール 10.0mg
効能効果	きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒	きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和
用法用量	1日1～3回、適量を肛門部に塗布する。	成人(15歳以上)は、1回1個を1日1～3回、肛門内に挿入する。
承認日	令和1年6月14日	令和1年6月14日
一物多名称	ヒールH軟膏Ex α ■	ヒールH坐剤Ex α
	エカイH軟膏Ex α	エカイH坐剤Ex α
	オノエH軟膏Ex α ■	オノエH坐剤Ex α ■
	ラホヤH軟膏Ex α	ラホヤH坐剤Ex α
	エプールH軟膏Ex α ■	エプールH坐剤Ex α ■
		ジシンコウ坐薬S■

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

外用痔疾用薬2

販売名	レーパンH軟膏EX■	レーパンH坐剤EX■	レーパンH注入軟膏EX■	ラナンキュラス注入軟膏■	レーパンH坐剤■	レーパンZ軟膏
リスク分類	②	②	②	②	②	②
性状	軟膏	坐剤	軟膏	軟膏	坐剤	軟膏
成分分量	100g中 リト'カイン 3.0g ヒドロコルチゾン酢酸エステル 0.5g 酸化亜鉛 4.0g イソプロピルメチルフェノール 0.1g クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.2g アラントイン 1.0g グリチルレチン酸 0.3g トコフェロール酢酸エステル 3.0g	1個中 リト'カイン 60.0mg ヒドロコルチゾン酢酸エステル 5.0mg 酸化亜鉛 80.0mg イソプロピルメチルフェノール 2.0mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 4.0mg アラントイン 20.0mg グリチルレチン酸 6.0mg トコフェロール酢酸エステル 60.0mg	1個中 リト'カイン 60.0mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 4.0mg アラントイン 20.0mg トコフェロール酢酸エステル 2.5g トコフェロール酢酸エステル 50.0mg	100g中 ブレドニゾロン酢酸エステル 1.0mg リト'カイン 3.0g アラントイン 1.0g トコフェロール酢酸エステル 100mg トコフェロール酢酸エステル 2.5g アラントイン 20mg グリチルレチン酸 40mg I-メントール 18mg	1日量(2個)中 ヒドロコルチゾン酢酸エステル 0.05g リト'カイン 120mg トコフェロール酢酸エステル 100mg アラントイン 20mg グリチルレチン酸 40mg	100g中 ブレドニゾロン酢酸エステル 0.05g リト'カイン 3.0g トコフェロール酢酸エステル 2.5g アラントイン 1.0g グリチルレチン酸 0.5g
効能効果	きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒	きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和	きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和	きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和	きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和	きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和
用法用量	1日1~3回、適量を肛門部に塗布する。	成人(15歳以上)1回1個を、1日1~3回、肛門内に挿入する。15歳未満は使用しないこと。	成人(15歳以上)は1回1個を、1日1~2回、/ゾル部分を肛門内に挿入し、全量をゆっくり注入する。または1日1~3回、適量を肛門部に塗布する。なお、一度塗布に使用したものは、注入には使用しないこと。	成人(15歳以上)は1回1個を、1日1~2回、/ゾル部分を肛門内に挿入し、全量をゆっくり注入する。または1日1~3回、適量を肛門部に塗布する。なお、一度塗布に使用したものは、注入には使用しないこと。	成人(15歳以上);1回1個を1日1~2回、肛門内に挿入する。または1日1~3回、適量を肛門部に塗布する。なお、一度塗布に使用したものは、注入には使用しないこと。	1日3回、適量を肛門部に塗布する。
承認日	平成29年6月7日	平成29年6月7日	平成29年6月7日	平成17年3月22日	平成6年7月26日	平成5年7月2日
一物多名称	ヒフルH軟膏EX■	ヒフルH坐剤EX	ヒフルA注入軟膏EX	ヒフルA注入軟膏	エプールH坐剤	エプールH軟膏
	エカイH軟膏EX■	エカイH坐剤EX	エカイA注入軟膏EX	エカイA注入軟膏	ヒフルH坐剤	ヒフルH軟膏
	オノフェH軟膏EX	オノフェH坐剤EX■	オノフェA注入軟膏EX■	オノフェA注入軟膏■	エカイH坐剤	エカイH軟膏
	ラホヤH軟膏EX■	ラホヤH坐剤EX	ラホヤA注入軟膏EX■	レーパンH注入軟膏■	オノフェH坐剤	オノフェH軟膏
	エプールH軟膏EX■	エプールH坐剤EX	エプールA注入軟膏EX■	ラホヤA注入軟膏	レーパンG坐剤	
	ラウマーH軟膏EX■			キルカミンA注入軟膏		
	カナウH軟膏EX■			エプールA注入軟膏■		
	パンキード軟膏EX					

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

外用痔疾用薬3

販売名	レーパンW	レーパンH■	レーパンP軟膏「万協」	レーパン坐薬	レーパンGローション■	レーパンG軟膏■	レーパン■
リスク分類	2	②	2	2	2	2	2
性状	芳香の白色軟膏	芳香の白色軟膏	芳香の淡黄白色軟膏	軟カプセル剤	無色透明発泡性芳香の液	芳香の白色軟膏	無色爽快な香りの液
成分分量	100g中 アミノ安息香酸エチル 1.0g リトカイン 2.0g クロルヘキシジン塩酸塩 0.2g グリチルレチン酸 0.4g アラントインクロルヒドロキシアルミニウム 0.3g	100g中 ヒドロコルチゾン酢酸エステル 0.25g リトカイン 3.0g クロルヘキシジン塩酸塩 0.2g グリチルレチン酸 0.4g アラントインクロルヒドロキシアルミニウム 0.3g	100g中 グリチルレチン酸 0.3g アミノ安息香酸エチル 2.0g クロルヘキシジン塩酸塩 0.1g グリチルレチン酸 0.4g アラントインクロルヒドロキシアルミニウム 0.3g	2カプセル中(2820mg中) ジブカイン塩酸塩 10mg トコフェロール酢酸エステル 40mg オキアミシン末 0.5g 酸化亜鉛 5.0g	100ml中 β-グリチルレチン酸 40mg プロカイン塩酸塩 0.1g アラントイン 10mg	100ml中 ベンザルコニウム塩化物 0.05g プロカイン塩酸塩 0.1g ナファゾリン塩酸塩 0.05g クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.05g	100ml中 次硝酸ビスマス 10.0g アミノ安息香酸エチル 5.0g ナファゾリン塩酸塩 0.02g オキソアミン 0.5g ヨーケレチン 0.5g グリチルレチン酸 0.4g 酢酸dl-α-トコフェロール 0.5g
効能効果	痔による痛み・かゆみ・はれ・出血	痔による痛み・はれ・かゆみ・出血	次の場合の症状の緩和 いぼ痔、はれ痔、かゆ痔、切れ痔、出痔、痔出血	次の場合の症状の緩和 いぼ痔、はれ痔、かゆ痔、切れ痔、出痔、痔出血	いぼ痔、切れ痔、脱肛、肛門の裂創、肛門周囲炎、肛門部、外陰部のそう痒症	内痔核、外痔核、裂肛、脱肛、肛門湿疹、肛門そう痒、肛門潰瘍	肛門周囲炎、脱肛、肛門裂創、痔核、陰部そう痒症、男女陰部清浄
用法用量	1日1~3回適量を患部に塗布するか、またはガーゼにのばして貼布する。	1日1~3回適宜量を患部に塗布するか、またはガーゼにのばして貼付する。	1日1~2回適宜量をそのまま塗布するか、ガーゼにのばして貼布する。	1日1カプセル、1日1~2回、肛門内に挿入する。	脱脂綿またはガーゼに本液を浸して、1日数回患部を清拭するか、またはあん法する。	1日1~2回、適宜量をそのまま塗布するか、ガーゼにのばして貼布する。	脱脂綿又はガーゼに浸して1日数回患部を清拭する。
承認日	昭和60年10月16日	昭和60年9月26日	昭和57年8月21日	昭和53年2月17日	昭和45年3月18日	昭和41年8月22日	昭和36年6月10日

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

うがい薬・歯科口腔用薬1

製品名	イマジンうがい薬■	リップペール■	ヒフル口内炎軟膏■	ヒフルAC■	ファインスロート
リスク分類	3	3	②	1	3
性状	含嗽剤(液剤)	口腔用半固形剤	白色の芳香の軟膏	白色の軟膏	赤褐色粘稠性の液
成分・分量	100ml中 ホピトノヨード 7.0g	100g中 アラントイン 0.5g パンテノール 0.5g ピリドキシン塩酸塩 0.1g グリチルレチン酸 0.3g トコフェロール酢酸エステル 0.2g	100g中 トリアムシソロンアセトリド 0.1g	100g中 アシクロビル 5.0g	100ml中 ヨウ素 0.5g ヨウ化カリウム 1.0g
効能・効果	口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去	口唇のひびわれ、口唇のただれ、口唇炎、口角炎	口内炎(アフタ性)	口唇ヘルペスの再発(過去に医師の診断・治療を受けた方に限る)	のどの殺菌・消毒
用法・用量	1回、本剤2~4mlを水約60mlに薄めて、1日数回うがいしてください。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日1~数回、適量を患部に塗布する。	1日3~5回、適量を患部に塗布する。(唇やそのまわりにピリピリ、チクチクなどの違和感をおぼえたら、すぐに塗布する。)	1日数回のどの粘膜面に噴射塗布して用いる。
承認日	令和5年1月27日	令和4年6月16日	平成28年1月20日	平成24年4月19日	平成7年1月13日
一物多名称	エフカイうがい薬	ユアリップ [®]	エフル口内炎軟膏■	エフルAC	
	エフルうがい薬	リペアリップ [®]	オノフェ口内炎軟膏■	オノフェAC	
	バンキョーうがい薬	バンパースリップ [®]	ラウマーロ内炎軟膏■	ラウマーアC	
		ヒフルリップ [®]	ラホヤロ内炎軟膏	ラホヤAC	
			キルカミンロ内炎軟膏■	キルカミンAC	
			デオブランカロ内炎軟膏	バンキーAC	
			バンキーロ内炎軟膏		

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

うがい薬・歯科口腔用薬2

製品名	クリアスロート	デンタルBBカプセル	うがいコンク	リップクリーム「万協」	デンタルSクリーム	デンタルピルクリーム■	デンタルクリーム■
リスク分類	3	3	2	3	2	②	2
性状	赤褐色粘稠性の液	硬カプセル剤	淡橙色半透明芳香の液体	白色の芳香の軟膏	淡紫色芳香の軟膏	淡緑色軟膏で芳香	白色の軟膏で芳香
成分・分量	1ml中 ポヒトショード' 4.5mg リボラビン 30mg ピリドキシン塩酸塩 100mg ニコチン酸アミド' 60mg パントテン酸カルシウム 30mg オロチ酸 100mg	2カプセル中 ヒビテングルコネト液 0.075ml ハッカ油 6mg ユーカリ油 1mg レーモントール 15mg	1ml中 ジ'パルミチン酸ピリドキシン 0.5g イソフロビルメチルフェノール 0.05g レーモントール 0.05g	100g中 フェノール 0.1g クロヘキシジン塩酸塩 0.3g アスレン 0.02g レーモントール 0.1g	100g中 ブレドニゾロン 0.2g 塩化セチルピリジニウム 0.1g	100g中 ジフカイン塩酸塩 1.0g アミノ安息香酸エチル 0.3g 塩化セチルピリジニウム 0.1g レーモントール 0.1g	100g中
効能・効果	のどの炎症によるのどのあれ、のどの痛み、のどのはれ、のどの不快感、声がれ 口角炎、口唇炎、口内炎、舌炎、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、にきび、肌あれ「ただし、これらとの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」次の場合のビタミンB2B6の補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時	口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去	口唇乾燥症(ひびわれ、あれ)、口唇炎(ただれ)、口角炎(びらん)	口中のはれ、ただれ、切り傷、痛み	歯肉炎、歯根炎、口内炎、口角炎、口唇炎	虫歯、歯根炎、歯肉炎等による歯痛、歯槽膿漏、口内炎、口角炎	
用法・用量	1日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布して用いる。 成人(15才以上)1回1カプセル 1日2回服用する。	1回、約0.25mlを水約80mlで薄めて、うがい液とし、1日数回うがいする。	1日数回、適宜量を口唇に塗布または塗擦する。	清潔な指先または脱脂綿に適量(約0.2~0.5g)をつけて、1日2~3回歯茎をマッサージする。または炎症の部分に適量を塗擦する。	1日数回、適量を清潔な指先、又は脱脂綿につけて、患部に塗擦する。	1日数回、適量を清潔な指先、または脱脂綿につけて、患部に塗擦する。虫歯には、そのくぼみ並びに歯肉に塗布する。	
承認日	平成6年7月22日	昭和63年8月1日	昭和54年11月8日	昭和44年12月19日	昭和44年9月3日	昭和39年7月6日	昭和39年3月13日

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

化膿性疾患用薬

製品名	紫雲膏ヒール■	ボルネF■	ネオ・テーマ	ターマンS■	パンパス軟膏■	ボルネガーゼ「協励」
リスク分類	2	2	2	2	2	2
性状	軟膏	軟膏	淡桃色芳香の軟膏	白色軟膏	淡黄色、芳香の軟膏	無色で特異臭の薬液にガーゼを浸漬したもの
成分分量	1117g中 シコン 120g トウキ 80g コマ油 1000g ミツロウ 300g 豚脂 30g	100g中 スルファジアシン 5.0g 酸化亜鉛 5.0g アラントイン 0.5g	100g中 酸化亜鉛 30.0g アミノ安息香酸エチル 1.5g 次没食子酸ピスマス 1.5g スルファジアシン 5.0g グリチルレチン酸 0.6g	100g中 スルファジアシン 5.0g 酸化亜鉛 5.0g ジフェンヒドラミン塩酸塩 0.5g dl-塩酸メチルエフテリン 0.5g 卵黄油 0.5g	100g中 酸化亜鉛 6.0g フェノール 0.5g サリチル酸 0.1g イソプロピルメチルフェノール 0.05g ヨークレチン 0.5g	100g中 サリチル酸 2.0g 龍脳 5.0g
効能効果	(一般用の場合) ひび、あかぎれ、しもやけ、魚の目、あせも、ただれ、外傷・火傷、痔の痛み (配置や向けの場合) ひび、あかぎれ、しもやけ、ただれ、軽微の外傷・火傷、痔の痛み	化膿性皮膚疾患(とびひ、めんちょう、毛のう炎)	とびひ、にきび、面ちょう、化膿性皮膚疾患	一般創傷、切傷、すり傷、化膿性疾患、急慢性湿疹、蕁麻疹、痒疹、毒虫刺傷、かぶれ、火傷、小児ストロフルス	やけど、きりきず、すりきず、日やけ、しもやけ、ひび、あかぎれ、かぶれ、ただれ、よう、ちょう、くさ、ぢ	ねぶと、よう、ちょう、腫物
用法用量	適量を患部に塗布またはよく擦り込む、またはガーゼ・脱脂綿に塗布して患部に貼る。	1日数回、適量を患部に塗布するか、又はガーゼ等に延ばして貼る。	患部及びその周辺を清拭したのち、1日1~2回適宜量を塗布する。	1日2~3回適量をガーゼに延し、又は直接患部に塗擦又は塗布する。	1日2~3回患部に塗布又は貼用する。	1日数回本薬液に浸されたガーゼを患部に貼布する。
承認日	平成28年9月6日	平成15年3月20日	昭和52年11月14日	昭和45年12月2日	昭和39年2月22日	昭和37年2月24日
一物多名称	紫雲膏ナルガ	エプールG■				
	紫雲膏マユール	ヒールH■				
	紫雲膏テーマ	デオブランカF■				
		ラホヤF				
		ラウマーF■				
		キルカミンF				
		オノフェF■				

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

にきび治療薬

販売名	ヒフルアクネスプレー	ラウマーアクネクリーム■	ヒフルアクネクリーム
リスク分類	2	2	2
性状	ポンプスプレー剤	クリーム	クリーム
成分分量	100g中 アラントイン 0.2g サリチル酸 0.5g エタノール 22.84g	100g中 イブプロフェンピコノール 3.0g イソプロピルメチルフェノール 0.3g ※香料有り	100g中 イブプロフェンピコノール 3.0g イソプロピルメチルフェノール 0.3g
効能効果	にきび	吹き出物、にきび	吹き出物、にきび
用法用量	1日2回(朝・晩)、適量を患部に噴霧する。顔には適量を手にとり塗布する。	1日数回、石けんで洗顔後、適量を患部に塗布する。	1日数回、石けんで洗顔後、適量を患部に塗布する。
承認日	令和5年5月24日	平成28年12月26日	平成24年9月13日
一物多名称	エプールアクネスプレー エフカイアクネクリーム ラカルアクネクリーム ナルガアクネクリーム ラバルンアクネクリーム	キルカミアクネクリーム オノフェアクネクリーム■ ラカナウアクネクリーム■ ナルガアクネクリーム	エプールアクネクリーム■ オノフェアクネクリーム■ ラカナウアクネクリーム■ ナルガアクネクリーム

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

殺菌消毒薬1

販売名	ジアヒフル
リスク分類	3
剤型	消毒剤
成分分量	100mL中 次亜塩素酸ナトリウム 0.026g
効能効果	手指の消毒、食品製造器具の消毒、調理器具・食器の消毒、野菜・果実の消毒、飲料水の消毒、水泳プールの消毒、便所・浴室の消毒、室内の消毒
用法用量	手指の消毒、食品製造器具の消毒、調理器具・食器の消毒は、本剤に浸すか、清拭する。野菜・果実の消毒は本剤の3倍希釈液に浸す。飲料水の消毒は遊離残留塩素濃度が0.1ppm以上になるように用いる。水泳プールの消毒は遊離残留塩素濃度が0.4～1.0ppmになるように用いる。便所・浴室の消毒、室内の消毒は本剤を用いて清拭する。
承認日	2021/1/15申請
一物多名称	イマジーンS■ ■ ■ ■ ■

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

殺菌消毒薬2

販売名	ヒフルAPローション	エプール消毒薬	ケーパイン消毒薬■	ボルネ	パンパスト	テープ軟膏
リスク分類	3	3	2	2	2	2
性状	液	液	液	無色透明芳香の液	無色透明の液	黄色軟膏
成分分量	100mL中 ベンセトニウム塩化物 0.01g グリチルリチン酸二カリウム 0.12g アラントイン 0.12g トコフェロール酢酸エステル 0.10g	100mL中 ポヒドンヨード 10.0g	100mL中 ジブカイン塩酸塩 0.1g ナファゾリン塩酸塩 0.1g クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.2g ベンサルコニウム塩化物 0.1g	100mL中 ジブカイン塩酸塩 0.1g ナファゾリン塩酸塩 0.1g クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.2g ベンサルコニウム塩化物 0.1g	100mL中 グルコン酸クロルヘキシジン液 0.5ml クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.2g	100g中 アミノ安息香酸エチル 2.5g dl-塩酸メチルエフェトリン 0.1g アクリノール 0.15g 酸化亜鉛 5.0g 次没食子ビスマス 3.0g 卵黄油 0.5g
効能効果	かき傷、創傷面の殺菌・消毒、とびひ・おでき等の感染皮ふ面の消毒、さり傷、すり傷、さし傷、靴ずれ	切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、とびひ、おでき等の感染皮膚面の消毒	切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒	きり傷、すり傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾時の肛門の消毒	切傷、さし傷、かき傷、すり傷、靴ずれ、手指・創傷面の殺菌・消毒	外傷(切傷、すり傷、つき傷)、靴ずれ
用法用量	1日数回、適量を患部に塗布してください。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回噴霧又はガーゼ・脱脂綿などに浸して塗布する。	1日数回、脱脂綿またはガーゼに浸して患部に塗布する。	1日数回脱脂綿またはガーゼに浸して患部を清拭する。	1日2乃至3回患部に適量を塗布する。
承認日	平成25年4月23日	平成17年10月24日	平成11年6月30日	昭和60年2月8日	昭和58年12月26日	昭和54年11月8日
一物多名称	エプールAPローション エフカイAPローション オノフェAPローション	ラウマー消毒薬 エフカイ消毒薬 オノフェ消毒薬	レーパンGローション2 キズクリア パンパスト消毒薬 ヒフル消毒薬 マンナ消毒薬 トラット消毒薬 アージュ消毒薬			

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

ひび・あかぎれ用薬

販売名	ヒビヒフル α ■	ヒビヒフル ■	ヒフルバン ■
リスク分類	3	3	3
性状	白色のクリーム	白色のクリーム	ローション
成分分量	100g中 ビタミンA油 0.5g トコフェロール酢酸エステル 2.0g アラントイン 0.2g グリチルレチン酸 0.3g イソプロピルメチルフェノール 0.1g ジフェニヒドラン 0.5g グリセリン 40.0g	100g中 トコフェロール酢酸エステル 2.0g イソプロピルメチルフェノール 0.1g I-メントール 1.35g dl-カンフル 9.6g サリチル酸メチル 3.0g	100g中 ピロキシリソ 12.0g
効能効果	ひじ・ひざ・かかとのあれ、 ひび、あかぎれ、指先・手 のひらのあれ、しもやけ	ひび、あかぎれ、しもや け、かゆみ	ひび、あかぎれ、さかむ け、小きりきず、すりきず
用法用量	1日数回、適量を患部に塗 布する。	1日数回、適量を患部に塗 布または塗擦する。	患部を清潔にし、傷部の みに適量を塗り、そのまま 静かに乾燥させる。
承認日	平成29年10月12日	平成23年9月20日	平成23年10月18日
一物多名称	ヒビエプール α ■ ヒビラウマー α ■ ヒビオノフェ α ■ ヒビラホヤ α ■ ヒビトロマ α ■ ヒビアージュ α ヒビカカット α	ヒビエプール ■ ヒビラウマー ■ ヒビオノフェ ヒビラホヤ ヒビトロマ テオブランカバン	ラホヤバン ラカナウバン ■ エフカイバン パルムユーバン ■ テオブランカバン

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

瀉下薬

製品名	通源顆粒	通源細粒(協勵)	通源細粒「協勵」	ツーケンC	通源「協勵」
リスク分類	②	②	②	②	②
性状	淡黄緑褐色の顆粒	緑褐色の細粒	茶褐色の細粒	硬カプセル剤	濃緑褐色の粉末
成分・分量	1日量(2包)中 ダイオウ末 0.45g センナ末 0.75g シャクヤク末 0.40g カンゾウ末 0.40g	1日量(2包)中 ダイオウ末 0.85g センナ末 0.75g シャクヤク末 0.40g カンゾウ末 0.40g	1日量(4包)中 センナ末 1500mg ダイオウ末 800mg カソウ末 800mg シャクヤク末 800mg	1日量(4カプセル)中 ダイオウエキス 120mg カソウエキス 200mg シャクヤクエキス 80mg センナド 32mg	1日量(4包)中 センナ末 1.5g ダイオウ末 0.8g カソウ末 0.8g シャクヤク末 0.8g
効能・効果	・便秘 　・便秘に伴う次の症状の緩和:頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醸酵、痔	・便秘 　・便秘に伴う次の症状の緩和:頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醸酵、痔	・便秘 　・便秘に伴う次の症状の緩和:頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醸酵、痔	・便秘 　・便秘に伴う次の症状の緩和:頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醸酵、痔	・便秘 　・便秘に伴う次の症状の緩和:頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醸酵、痔
用法・用量	大人(15才以上)1回1~2包 1日1回空腹時に服用すること。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ增量又は減量すること。	1.大入包装 大人(15歳以上)1回0.6~1.2g 11歳以上15歳未満1回0.4~0.8g 7歳以上11歳未満1回0.3~0.6g 1日2回、朝夕の空腹時服用すること。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量や減量すること。 2.分包品 大人(15歳以上)1回1/2~1包 11歳以上15歳未満1回1/3~2/3包 7歳以上11歳未満1/4~1/2包	1.分包剤 大人(15歳以上)1回1包~2包 1日2回 2.大入り剤 大人(15歳以上)1回1.31~2.62gを限度とし、なるべく空腹時に服用すること。服用間隔は4時間以上おくこと。ただし、便秘の程度、状態には個人差があるので、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ增量又は減量すること。	大人(15才以上)1回1~2カプセルを、1日2回を限度とし、なるべく空腹時に服用すること。服用間隔は4時間以上おくこと。ただし、便秘の程度、状態には個人差があるので、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ增量又は、減量すること。	大人(15才以上)1回1包~2包 1日2回を限度とし、なるべく空腹時に服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。ただし、便秘の程度、状態には個人差があるので、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量や減量すること。
承認日	平成6年9月28日	平成6年1月28日	昭和63年7月4日	昭和62年6月22日	昭和62年3月31日
一物多名称	新通源 スルーラン ローヤル漢方便秘薬「細粒」				

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

消化器官用薬

製品名	強力パンジア「万協」	強力パールミックス「万協」	パールミックス「万協」	テコール「万協」
リスク分類	2	②	3	3
性状	淡褐色の粉末	淡黄褐色の粉末で芳香	淡黄色の粉末で特異臭	淡褐色の微粉末
成分・分量	3包中 炭酸水素ナトリウム 900mg 合成ヒドロタルサイト 1200mg 沈降炭酸カルシウム 822mg ロートエキス散 300mg ケンチアナ末 180mg	3包中 DL-メチオニン 1.0g 塩酸チアミン 0.02g ビタミンB2 0.007g dl-塩酸メチルエフェトリン 0.05g クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.01g ニコチン酸アミド 0.03g パントテン酸カルシウム 0.02g	3包中 dlメチオニン 1.0g ビタミンB1 0.02g ビタミンB2 0.007g	1000g中 テヒドロコール酸 5.0g 胆汁末 250.0g
効能・効果	胃酸过多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、吐き気(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、恶心)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)、胃痛	肝臓疾患、宿醉、黄疸、自家中毒、蕁麻疹、アレルギー性皮膚炎、にきび、しみ、口内炎、食餌中毒、つわり	肝臓疾患、黄疸、宿醉、自家中毒、つわり、蕁麻疹、急性慢性湿疹、アレルギー皮膚疾患、疲労回復、にきび、口内炎	消化不良、肝臓及び胆囊機能障害、胆石痛、黄疸、胃痛、腹痛、蕁麻疹、つわり、胃酸过多、宿醉、急性慢性下痢、便秘
用法・用量	大人(15才以上)1回1包 11才以上15才未満 1回 2/3包、8才以上11才未満 1回1/2包 5才以上8才未満 1回1/3包 いずれも1日3回食後に服用する。	1日3回適宜服用する。1回 大人1包宛 15才未満7才まで1/2包 7才未満5才まで1/3包 5才未満2才まで1/6包 2才未満1/10包	1日3回適宜服用する。1回 大人1包宛 15才未満7才まで1/2包 7才未満5才まで1/3包 5才未満2才まで1/6包 2才未満1/10包	一般症状には大人1回 0.5g宛 1日3回食後服用 急性下痢胃痛には1回 1.0g頓用 便秘には1日1回1.5~2.0g夕食後服用する。
承認日	昭和56年8月14日	昭和37年3月27日	昭和36年6月10日	昭和36年5月22日

その他

育毛剤

製品名	ガミングアウト■	ガミングアップ■
リスク分類	2	2
剤型	外用液剤	外用液剤
	100mL中 カルブロニウム塩化物 1.0g ハントニールエチルエーテル 1.0g ビードキシン塩酸塩 0.05g ジフェンヒドラミン塩酸塩 0.1g サリチル酸 0.2g I-メントール 0.3g 香料入り	100mL中 カルブロニウム塩化物 1.0g ハントニールエチルエーテル 1.0g ビードキシン塩酸塩 0.05g ジフェンヒドラミン塩酸塩 0.1g サリチル酸 0.2g I-メントール 0.3g
成分分量		
効能効果	発毛促進、育毛、脱毛(抜毛)の予防、若禿(壮年性脱毛症)、薄毛、ふけ、かゆみ、病後・産後の脱毛、粒糠性脱毛症、円形脱毛症	発毛促進、育毛、脱毛(抜毛)の予防、若禿(壮年性脱毛症)、薄毛、ふけ、かゆみ、病後・産後の脱毛、粒糠性脱毛症、円形脱毛症
用法用量	1日2~3回適量を頭皮・頭髪にふりかけ、マッサージする。	1日2~3回適量を頭皮・頭髪にふりかけ、マッサージする。
承認日	令和4年8月3日	令和4年8月3日
一物多名称	リペアプロ リペティア	クロシェット

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

鼻炎用点鼻薬

ヒフルAL鼻炎スプレー	エプールN点鼻薬■
2	2
液	液
100ml中 ケトフェンファル酸塩 0.0756g	100ml中 ナファゾリン塩酸塩 0.05g クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.5g リカイン 0.5g グリチルリチン酸二カリウム 0.3g ベンザルコニウム塩化物 0.02g
平成26年4月10日	平成17年6月28日
エプールAL鼻炎スプレー	ヒフルN点鼻薬■
エフカイAL鼻炎スプレー	エカイN点鼻薬■
オノフェAL鼻炎スプレー	

ビタミン主薬製剤

ナチュリアEC
3
黄色の分包顆粒剤
1日量(3包)中 酢酸d-α-コフェニール 300mg アスコルビン酸 1000mg L-アスコルビン酸ナトリウム 1124.7mg 酪酸リボフラビン 3mg
3包(3.0g)中 dl-塩酸メチルエフェリソ 60mg グリセリンモノグアヤコールエーテル 180mg サリチル酸ベナゾン 60mg 無水カフェイン 150mg カンゾウエキス末C 180mg

呼吸器官用薬

ゼントップ「協励」
②
淡茶褐色の粉末で特異なにおい
1日3回、適宜服用する。1回大人1包 11才以上～15才未満 2/3包、8才以上～11才未満1/2包 5才以上～8才未満1/3包
昭和42年7月6日

医薬部外品1

消毒剤

きず消毒保護剤

外皮消毒剤

含嗽薬(液剤)

製品名	ヒフルA薬用手指消毒液■	ヒフルA薬用手指消毒ジェル■	ヒフルL薬用手指消毒ジェル	ヒフルラップパン	ケーパイン消毒液A■	ヒフルクリアうがい薬■
分類	新指定医薬部外品	新指定医薬部外品	新指定医薬部外品	指定医薬部外品	指定医薬部外品	
剤型	消毒剤	消毒剤	消毒剤	ローション	無色透明の液体	含嗽薬(液剤)
成分分量	100mL中 ベンザルコニウム塩化物 0.05g	100mL中 ベンザルコニウム塩化物 0.05g	100mL中 ベンザルコニウム塩化物 0.05g	100g中 トリクロカルバニロト [®] 0.1g	100ml ベンザルコニウム塩化物 0.05g セチルピリジニウム塩化物水和物 0.25g グリチルリチン酸二カリウム 0.25g	100mL中
効能効果	手指・皮膚の洗浄・消毒	手指・皮膚の洗浄・消毒	手指・皮膚の洗浄・消毒	すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆)	すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒	口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去
用法用量	適量を手指に取り、塗布または塗擦する。	適量を手指に取り、塗布または塗擦する。	適量を手指に取り、塗布または塗擦する。	傷面の水分や付着物をよくふきとり、適量を患部に塗布し乾燥させる。	1日数回患部に噴霧又はガーゼ、脱脂綿などに浸して塗布する。	1回約1mLを約50mLの水にうすめてうがいする。1日数回行う。
承認日	令和2年6月29日	令和2年6月23日	令和2年6月23日	平成23年9月5日	平成12年10月23日	令和3年3月26日
一物多名称	オノフェA薬用手指消毒液	オノフェA薬用手指消毒ジェル	オノフェL薬用手指消毒ジェル	ラカナウラップパン	ケーパイン消毒液E	エプロールクリアうがい薬■
	エプロールA薬用手指消毒液	エプロールA薬用手指消毒ジェル■	エプロールL薬用手指消毒ジェル■	エフカイラップパン■	エプロール消毒液	エフカイクリアうがい薬■
	ラホヤA薬用手指消毒液	ラホヤA薬用手指消毒ジェル■	ラホヤL薬用手指消毒ジェル	トロマラップパン	アージュ消毒液	イマジンクリアうがい薬■
	ラウマーA薬用手指消毒液■	ラウマーA薬用手指消毒ジェル	ラウマーL薬用手指消毒ジェル	ラップパン		バンキヨークリアうがい薬
	モンルナA薬用手指消毒液	モンルナA薬用手指消毒ジェル	モンルナL薬用手指消毒ジェル	ラップ [®] 紺A■		
				ラップ [®] パン液体紺創膏■		

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

医薬部外品2

薬用化粧品

製品名	ラバルン薬用HPゲル	ラバルン薬用HPクリーム	ラバルン薬用HPローション
分類	医薬部外品	医薬部外品	医薬部外品
剤型	半固体剤ゲルタイプ [■]	半固体剤乳化タイプ [■]	ローションタイプ [■]
成分分量	100g中 ヘパリン類似物質 0.1g グリチルリチン酸ジカリウム 0.1g	100g中 ヘパリン類似物質 0.1g グリチルリチン酸ジカリウム 0.1g	100g中 ヘパリン類似物質 0.1g グリチルリチン酸ジカリウム 0.1g
効能効果	肌あれ、あれ性。あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。	肌あれ、あれ性。あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。	肌あれ、あれ性。あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。
用法用量	適量を皮膚に塗布する。	適量を皮膚に塗布する。	適量を皮膚に塗布する。
承認日	令和3年11月12日	令和3年11月16日	令和3年11月12日
一物多名称	マユール薬用HPゲル プライル薬用HPゲル	マユール薬用HPクリーム プライル薬用HPクリーム	マユール薬用HPローション プライル薬用HPローション

忌避剤

ヒフルD虫よけクリーム■	ペレトンセリー
医薬部外品	医薬部外品
クリーム剤	ゲル剤
100g中 テイート 10.0g	100g中 テイート 5.0g
蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避	蚊、のみ、さしづえの刺咬の防止
適量を手にとり、首筋・腕・足などお肌の露出部分に塗りのばす。	1日、1~数回、手及び足などの害虫がさしやすい部位に、適宜量を塗布するかまたはすり込む。
令和4年11月2日	昭和55年7月10日

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

医薬部外品3

製品名	キヤミールクリームエクセレントQ ■	ヒールL	ナチュリア プラス	ナチュリア	ナチュリアスキンソフナー
分類					
性状	黄色のクリーム	芳香の無色澄明の液	芳香の乳白色の乳液	芳香の乳白色の乳液	芳香の無色澄明の液
成分分量	100g中 グリチルリチン酸ジカリウム 0.1g グリチルリチン酸二カリウム 0.1g	100ml中 イソプロピルメチルフェノール 0.03g イソプロピルメチルフェノール 0.1g アラントイン 0.1g	100g中 グリチルリチン酸モノアンモニウム 0.1g イソプロピルメチルフェノール 0.1g アラントイン 0.1g	100g中 グリチルリチン酸モノアンモニウム 0.1g イソプロピルメチルフェノール 0.1g アラントイン 0.1g	100ml中 グリチルリチン酸モノアンモニウム 0.1g アラントイン 0.1g ビオカタライザープラセンタ 1.0g
効能効果	肌あれ。あれ性。肌をひきしめる。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。	肌あれ。あれ性。あせも。ひび。にきびを防ぐ。肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌をととのえる。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。	あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。	あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。	日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。
用法用量	適宜適量を皮膚に塗布する。	適量を皮膚に塗布する。	適量をとり、指先で肌に塗る。	適量をとり、指先で肌に塗る。	手のひらに適量をとり、肌に塗布する。
承認日	平成24年9月25日	平成19年9月13日	平成3年2月12日	平成2年12月12日	平成2年6月19日
一物多名称	マユールαクリーム プラマルαクリーム ナルガαクリーム オードペルベ オードナルガ オードナルガ オードラホヤ オートロマ オーデテマ	ラウマーレ エフカイL オノフェL オードペルベ オードナルガ オードナルガ オードラホヤ オートロマ オーデテマ			

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

医薬部外品4

製品名	パールソフトクリーム	オリプローション「万協」	薬用デンタルDEW	パンパスマート	デオブランカローション■	パールソフト	デオブランカ(クリーム)
分類							
性状	白色のクリーム	芳香の白色乳状液	芳香の無色透明の液	白色の乳液	無色透明の芳香の液	白色の芳香の乳液	白色の芳香の軟膏
成分分量	100g中 ステアリルグリチルレチネート 0.05g γ-オリザノール 0.5g イソプロピルメチルフェノール 0.07g	100ml 塩化ベンザルコニウム 0.01g パラオキシ安息香酸エチル 0.025g パラオキシ安息香酸プロピル 0.015g	100ml中 塩化セチルビリシニウム 0.02g	100g中 グリチルレチン酸ステアリル 0.05g イソプロピルメチルフェノール 0.03g di-ヒドロイントカルボン酸ナトリウム 液 1.0g	100ml中 アルミニウムヒドロキシクロライド 5.0g ベンザルコニウム塩化物 0.05g	100ml中 ステアリルグリチルレチネート 0.05g イソプロピルメチルフェノール 0.3g	100g中 アラントインクロヒドロキシアルミニウム 0.5g イソプロピルメチルフェノール 0.1g β-グリチルレチノ酸 0.5g レモンタル 0.75g
効能効果	肌あれ、あれ性。あせも・しもやけ・ひび・あかぎれを防ぐ。かみそり負けを防ぐ。日やけによるしみ、そばかすを防ぐ。日やけ・雪やけ後のほてり。肌をひきしめる。肌を清潔にする。肌を整える。皮膚をそこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。	肌あれ、ひび、あかぎれ、皮膚の保護及び汚れの除去	歯根(肉)炎の予防、歯を白くする、口中を浄化する。	皮膚の清潔・殺菌・消毒。体臭・汗臭及びにきびを防ぐ。	わきが(腋臭)、皮膚汗臭、制汗	皮膚の清潔・殺菌・消毒。体臭・汗臭及びにきびを防ぐ。	制汗、わきが、汗臭
用法用量	適量をとり、適宜手指または皮膚に塗擦する。	手のひら又は脱脂綿に適量をとつて、1日数回患部に塗擦する。	適量(約10ml)を口に含み、ブラッシングする。	洗顔、入浴時に適量を水または温湯を使って泡立てて皮膚を洗ったのち十分に洗い流す。	適宜、適宜量を汗の出やすいところに塗布するか、または、噴霧する。	洗顔、入浴時に適量を水又は温湯を使って泡立てて皮膚を洗った後、十分洗い流す。	1日、1回～数回、適宜量を汗の出やすいところに塗布するかまたはすりこむ。
承認日	昭和57年11月10日	昭和37年5月11日	平成2年9月5日	昭和59年11月19日	昭和58年3月12日	昭和57年8月30日	昭和54年2月20日
一物多名称	パンパスマートクリーム	アクネローション「万協」					

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

医薬部外品5

薬用歯みがき類

製品名	新デンタルS「万協」
分類	
性状	芳香の白色の軟膏 100g中
成分分量	グリチルリチン酸 0.03g クロルヘキシジン塩酸塩 0.02g アラントインクロヒドロキシアルミニウム 0.2g
効能効果	歯槽膿漏の予防、歯根(肉)炎の予防、むし歯を防ぐ、歯を白くする。
用法用量	適当量を歯ブラシにとり、歯及び歯ぐきを塗擦する。
承認日	昭和59年5月23日
一物多名称	

き避剤	シャンプー	浴用剤	浴用剤	てんか粉類
ペレトンクリーム	ヒフルコンテ'イショニング'シャンプー	ハイサ'ブーン<グリーン>	ハイサ'ブーン	スキンパウダー「万協」
芳香の白色クリーム状 100g中	白色の粘性のある液体 100g中	橙黄赤色の芳香の結晶粉末 100g中	橙黄赤色の芳香の結晶粉末 100g中	白色の微粉末 100g中
グリチルリチン酸 0.03g クロルヘキシジン塩酸塩 0.02g アラントインクロヒドロキシアルミニウム 0.2g	ジエチルトルアミド 5.0g ジフェンヒドラミン 1.0g I-メントール 0.5g カンフル 0.5g	ミコナゾール塩酸塩 0.75g グリチルリチン酸ジカリウム 0.1g	乾燥硫酸ナトリウム 58.0g セスキ炭酸ナトリウム 38.173g	炭酸水素ナトリウム 25.0g 炭酸ナトリウム 40.0g ホウ砂 30.0g 塩化ナトリウム 5.0g
蚊、ブヨ、蚤、南京虫、虱、ダニ、毒蛾、蟻等の害虫による虫さされの予防	フケ・かゆみを防ぐ。毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。毛髪・頭皮を清浄にする。毛髪・頭皮をすこやかに保つ。	肩のこり、くじき、腰痛、神経痛、リウマチ、あせも、ただれ、しつしん、荒れ性、にきび、吹き出物、冷え性、ひび、あかぎれ、しもやけ、痔	あせも、荒れ性、うみみ、肩のこり、くじき、神経痛、しつしん、しもやけ、痔、ただれ、冷え性、腰痛、リウマチ	あせも、おしめかぶれ、かみそりまけ、ただれ、ひげそりあと、股ずれ
1日数回適宜皮膚にすり込む。	適量を手にとり、頭皮をマーサージするようによく洗ってからすすいでください。	家庭用風呂には8~10gを適当の温湯に溶かして使用する。洗顔またはおしぶりには、耳かき3~4杯を洗面器の温湯に溶かして使用する。	家庭風呂には8.0~9.0gを適当の温度の浴湯に溶解し使用する。洗顔には耳かき3~4杯を洗面器の温湯に溶かし使用する。	1日数回適量を撒布する。
	平成27年9月2日	昭和44年9月17日	昭和36年10月15日	昭和36年10月15日
	エプロンコンテ'イショニング'シャンプー			
	パンパスコンテ'イショニング'シャンプー			
	デオブランカコンテ'イショニング'シャンプー■			
	パンキーコンテ'イショニング'シャンプー			

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

化粧品1

製品名	まごコサミンクリームA■	まごころオールインワン ジェル■	まごころシャンプーSA■	まごころトリートメントSA■	まごころボディン'エル姫■	まごころ乳液こまめ■	まごころteaハンドジェル■
種別	保湿クリーム	ゲル剤	ヘアシャンプー	ヘアリンス	ゲル剤	乳剤	ゲル剤
性状	淡褐色のクリーム	赤色のゲル	白色の粘性のある液体	白色～乳白色的クリーム	透明のゲル	白色～乳白色的乳液	白色～乳白色的ゲル
表示成分	水、グルコサミンHCl、BG、グリセリン、パルミチン酸セチル、ジメチコン、ステアリアルアルコール、ステアリン酸グリセリル(SE)、セタノール、ミネラルオイル、ミリストン酸イソプロピル、ステアリン酸PEG-40、ラベンダー油、メントール、メチルパラベン、プロピルパラベン、チャエキス、ショウガ根茎エキス、エタノール、キサンタンガム、TEA、EDTA-2Na	水、BG、グリセリン、ベタイン、アスタキサンチン、ヘマトコッカスブルビアリスエキス、プラセンタエキス、ドブロビタイン、コカミドメチルMEA、ジステアリン酸グリコール、BG、セタノール、BG、グリセリン、ポリクオタニウム-52、ポリクオタニウム-10、ラウレス-16、チャエキス、ソメイヨシノ葉エキス、バーレル、シルス(タチバナ/レチカラ)果皮油、ヒマツ栗実エキス、セタール、アモノメチコン、セテアレス-7、セテアレス-13、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、フェノキシエタノール、エタノール、塩化Na、酢酸、酢酸Na、エチトロ酸、安息香酸Na、ベンゾテ酸5Na、EDTA-2Na、EDTA-3Na、硫酸Na、リン酸、メチルパラベン、BHT、香料	水、ラウレス硫酸Na、ラウレス-11カルボン酸Na、コカミドプロピルベタイン、DPG、イソステアラミドブロビタイン、コカミドメチルMEA、ジステアリン酸グリコール、BG、セタノール、BG、グリセリン、ポリクオタニウム-52、ポリクオタニウム-10、ラウレス-16、チャエキス、ソメイヨシノ葉エキス、バーレル、シルス(タチバナ/レチカラ)果皮油、ヒマツ栗実エキス、サンザシエキス、ヒアルロン酸Na、メチルイチアリノン、シクロロ・タシロキサン、ジメチコノール、エタノール、イソプロパノール、EDTA-2Na、BHT、香料	水、ジメチコン、アボカド油、セタノール、テトラエチルヘキサン酸ベンタエリスリチル、セトリモニウムブロード、ステアリルアルコール、BG、ステアリルアルコール(012-13)グリセリン、シルス(タチバナ/レチカラ)果皮油、オレンジ果汁、レモン果汁、ライム果汁、リンゴ果汁、モモ果汁、グレープフルーツ果実エキス、サンザシエキス、ヒアルロン酸Na、メチルイチアリノン、シクロロ・タシロキサン、ジメチコノール、エタノール、イソプロパノール、ブロビルバーバン、ブチルバーバン	水、PPG-10メチルグルコース、イソステアリン酸PEG-20ソリビタノン、ステアリン酸グリセリル、ステアリルアルコール、ヘニカルコール、スクワラン、オレインオリゴマー、ラウリルグルタミン酸ジ(エペラ液)末、ホホバ油、オレンジ油、トコフェロール、コレカルシフェロール、ボリアクリル酸Na、グリチルリチン酸2K、ボリリバート60、ジメチコン、カルボマー、デキストリン、エタノール、メチルパラベン、水酸化K	水、BG、グリセリン、ベタイン、シクロヘンタシロキサン、チャエキス、カキ葉エキス、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、加水分解コーンスター、セラミド3、アロエベラ液汁末、ホホバ油、オレンジ油、トコフェロール、コレカルシフェロール、ボリアクリル酸Na、グリチルリチン酸2K、ボリリバート60、ジメチコン、カルボマー、デキストリン、エタノール、メチルパラベン、水酸化K	
用法用量	手のひらに適量をとり、前進になじませてください。	洗顔のあと、適量を手にとり、やさしく顔全体になじませます。	髪を十分に予洗いした後、適量を手のひらで泡立てて髪全体に十分になじませ、丁寧に洗います。その後十分にすすぎます。	シャンプー後十分に水気をとり、毛先中心に適量塗布し、全体になじませます。その後毛先をもみ込み、ぬるま湯ですすぎ流します。	手のひらに適量をとり、デコルテ、腕、足などの全身になじませてください。	化粧水等で肌を整えた後、適量を手のひらにとり、顔全体にやさしくのばしてください。	適量(パール粒くらい)を指先にとり、お肌にのばしながら、やさしくなじませてください。
届出日	令和1年8月28日	平成29年10月12日	平成28年1月31日	平成28年1月31日	平成27年3月16日	平成26年4月28日	平成22年9月30日
一物多名称							ヒフルHジェル エフルHジェル オフエHジェル ラウマHジェル ラホヤHジェル キルカミントジェル シンカコHジェル トロマHジェル エフカイHジェル ラカナHジェル コクリスHジェル デオブランガHジェル バンキーHジェル

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

化粧品2

製品名	まごころ化粧水 希■	ゆづ香るまごころhoneyクリーム■	クロシェットフルールクリーム■	ヒフルリペアクリーム■	伊賀菱忍者クリーム■	伊勢志摩真珠クリーム■	熊野古道クリーム■
種別	ローション剤	クリーム	クリーム	クリーム	クリーム	クリーム	クリーム
性状	無色透明	白色～微黄色のクリーム	淡黃白色のクリーム	微黃白色～淡黃白色のクリーム	白色のクリーム	白色のクリーム	白色のクリーム
表示成分	水、BG、グリセリン、チャエキス、加水分解ヒアルロン酸、コメ発酵液、ダイズエキス、加水分解コラーゲン、セラミド3、アスコルビルリン酸Na、加水分解コーンスターチ、トコフェロール、コカルシフロール、PEG-60水添ヒマツ油、ヒドロキシエチルセルロール、PPG-10デニルガルコース、エタノール、ケン酸Na、ケン酸、フェノキシエタノール、香料	水、グリセリン、オレフィンオリゴマー、ジメチコン、テトラエチルヘキサノン、ヘンタエチル酸デキストロール、BG、PEG-150、ミスチン酸デキストロール、バーフィングリセリン、ホホバ油、クロロヘンタシロキサン、ホホバシロール、セラミド3、バルミチン酸セチル、オリジナルオイル、カルナウバロウ、コレステロール、セラミド3、バルミチン酸セチル、オレイン酸、アルギニン、カルボキシビニルポリマー、セタノール、水添レシチン、シア脂ムアルテラス培養物、チャエキス、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸アクリルゲル、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸アクリルゲル、ヒアルロン酸アスコルビル、酢酸トコフェロール、加水分解コーゲン、セラミド3、加水分解コーンスターチ、トコフェロール、コレカルシフロール、グリチルリチン酸2K、キサンタンガム、PEG-100水添ヒマツ油、ステアロイル乳酸Na、ステアロイルメチルタウリニウム、エタノール、EDTA-2Na、プロピルパラベン、メチルパラベン、エチルパラベン、香料	水、スクワラン、ベニルアルコール、BG、バフラン、オレイン酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリニウム)コポリマー、加水分解ヒドロキシエチル、コメヌカ油、ビ果実エキス、チャ葉エキス、テトラヘキシルデカンド酸アスカルビル、ヒアルロン酸Na、加水分解シルク、加水分解コラーゲン、加水分解コーンスターチ、セラミド3、酢酸トコフェロール、BG、ホリソルベート60、テトラオレイン酸リペース-60	水、スクワラン、ベニルアルコール、PG、バルミチン酸オキチル、シクロヘンタシロキサン、ホホバ油、ベニスチアリノ酸ホリグリセリル、10、パール、ヒエグサ葉状体10、パール、ヒエグサ葉状体エキス、デキストロリ、テラヘキシルデカンド酸アスカルビル、カロチン、グレープフルーツ果皮油、PEG-100水添ヒマツ油、ジメチコン、キサンタンガム、ステアロイルメチルタウリニウム、ステアロイル乳酸Na、EDTA-2Na、メチルパラベン、プロピルパラベン、水酸化K、TEA	水(海洋深層水)、ソルビトール、グリセリン、PG、ステアリルアルコール、オクタン酸セチル、ミリストリウム、ヒドロキシプロピル、バフラン、スクワラン、ステアリン酸、ミツロウ、オイスターエキス、ヒノキ油、オレンジ油、カルボマー、ジメチコン、メチルバラベン、プロピルバラベン、		
用法用量	手のひらに適量をとり、お顔全体になじませてください。	適量(パール粒くらい)を指先にとり、お肌にのばしながら、やさしくなじませてください。	適量(パール粒くらい)を指先にとり、お肌にのばしながら、やさしくなじませてください。	適量を指先にとり、お肌にのばしながら、やさしくなじませてください。手のひらで温めながら、ゆっくり伸ばすとよりなじませやすくなります。	適量(パール粒1～2個分)を指先にとり、お肌にのばしながら、やさしくなじませてください。	適量(パール粒くらい)を指先にとり、お肌にのばしながら、やさしくなじませてください。	適量(パール粒くらい)を指先にとり、お肌にのばしながら、やさしくなじませてください。
届出日	平成25年4月22日	平成24年1月12日	平成26年4月24日	平成23年7月4日	平成22年9月30日	平成21年12月14日	平成18年4月21日
一物多名称				パルムユーリペアクリーム■	菱の実クリーム	伊勢志摩クリーム	
					ヒフルクリーム		
					エフールNクリーム		
					オフエヌクリーム		
					ラウマーネクリーム		
					ラホヤNクリーム		
					キルカミンクリーム		
					シンタコNクリーム		
					トロマNクリーム		
					エフカインクリーム		
					ラカナウNクリーム		
					コクソSNクリーム		
					デオブランカNクリーム		
					パンキーンクリーム		

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

化粧品3

製品名	熊野古道乳液■	ぽっちやりクリーム	猪の倉源泉クリーム■	キャミールQ10クリームエクセレント■	キャミールQ10クリーム■	エイガーリーンEジェル■	エイガーリーンクリームジェル■
種別	乳剤	クリーム	クリーム	クリーム	クリーム	ジェル	ジェル
性状	白色の乳液	淡黄白色のクリーム	白色のクリーム	淡黄白色のクリーム	淡黄白色のクリーム	半透明の粘性の液	白色の粘性の液
表示成分	水(海洋深層水)、ソルビトール、グリセリン、PG、ステアリルアルコール、オクタン酸セチル、ミリスチン酸イソブチル、バラフィン、スクワラン、ステアリン酸、ミツロウ、オウ葉エキス、BG、カルボマー、アロエベラ液汁末、TEA、メチルパラベン、ヒノキ油、オレンジ油、カルボマー、ジメチコン、メチルパラベン、プロピルパラベン、フェノキシエタノール	水、加水分解コラーゲン、加水分解コーンスターク、セラミド3、トコフェロール、ホホバ油、グリセリン、ホリソルベート60、ゲットスクワラン、ステアリン酸、ミツロウ、オウ葉エキス、BG、カルボマー、アロエベラ液汁末、TEA、メチルパラベン、ヒノキ油、カルボマー、ジメチコン、メチルパラベン、プロピルパラベン、フェノキシエタノール	水、ソルビトール、温泉水、グリセリン、PG、ステアリルアルコール、BG、ハルミチン酸オクチル、シクロヘンタシロキサン、ホホバ油、ベンタステアリン酸ホリグリセリル-10、セリン、ジメチコン、ユビキノン、チオグリセロール、セラミド3、加水分解コラーゲン、加水分解コーンスターク、グリセリン、ステアリン酸セチル、セリシン、テトラヘキシルデカノン酸アスコルビル、酢酸コフェロール、メチルパラベン、プロピルパラベン、グリチルリチン酸2K、キサンタンガム、ユビキノン、ヒアルロン酸Na、EDTA-2Na	水、スクワラン、シクロメチコン、グリセリン、BG、ホホバ油、水添タノールアミン、パラベン	酢酸dl-α-トコフェロール、トリエタノールアミン、パラベン	酢酸dl-α-トコフェロール、トリエタノールアミン、パラベン	
用法用量	適量(ピ-玉くらい)を手にとり、お肌にのばしながら、やさしくなじませてください。入浴後やおやすみ前にお使いになると一層効果的です。	適量(パール粒くらい)を指先にとり、お肌にのばしながら、やさしくなじませてください。	適量(パール粒くらい)を指先にとり、お肌にのばしながら、やさしくなじませてください。	適量(パール粒くらい)を指先にとり、お肌にのばしながら、やさしくなじませてください。	適量(パール粒くらい)を指先にとり、お肌にのばしながら、やさしくなじませてください。	必要な量をとり、顔や体に擦り込んでください。	必要な量をとり、顔や体に擦り込んでください。
届出日	平成22年1月15日	平成17年1月19日	平成19年11月22日	平成20年9月16日	平成17年1月19日	平成19年11月29日	平成15年2月20日
一物多名称	素肌美ローション						
	ムネノコドウローション						
	ムネノコドウ乳液						
	クマノリックミルク						
	クマのコローション						
	ハンド・ユニケーション乳液						
	クマノコドウ乳液						
	りらっくすローション						
	熊野肌乳液						

*販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

化粧品4

製品名	エルブ'ジュールマイルドコンディショナー■	エルブ'ジュールマイルドシャンプー■	エルブ'ジュールリフレッシュクレンジング■	エルブ'ジュールモイスチャーローション■	エルブ'ジュールピュアリッチオイル■	エルブ'ジュールトリートメントマスク■	エルブ'ジュールアロマエッセンスクリーム■
種別	コンディショナー	シャンプー	クレンジングクリーム	化粧水	オイル	パック	クリーム
性状	芳香の白い粘性のある液	芳香の茶色い粘性のある液	芳香の白色のクリーム	芳香の無色透明の液	芳香の黄色透明の液	芳香の薄茶色のクリーム	芳香の淡黄白色のクリーム
表示成分	水・オリーブ油・ハイドロキシヒマツリ油・アルキル(C12,14)オキシヒドロキシプロピルアルキニンHCl・セタノール・加水分解コムギ・ヘチミン・ホホバ油・アーモンド油・ステアリルアルコール・ブチケン油・スパイクランバター油・ジャイアントモロイ・ヒマツリ油・ヒマツリ油・ココイルアルギニンエチルPCA・クエン酸	水・ココイルメチルアラニンNa・ラウリルグルコシド・ハチミツ・シナノキエキス・ヒドロキシプロピルグリセリヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド・ローズマリー油・スパイクランバター油・イランイラン油・ベイ油・タイム油・リンゴタンニン・ヒノキオール・ヘンチレングリコール・フェノキシエタノール・クエン酸	水・ハイドロキシヒマツリ油・カンテン・レモン油・イランイラン油・グリセラーフルーツ果皮油・ゼラニウム油・フェノキシエタノール・ココイルアルギニンエチルPCA	水・ハマメリスク水・ハチミツ・ソウハクヒエキス・エチナセラム根エキス・ティーツリー油・タイム油・ラベンダー油・ローズ油・ベンチレングリコール・フェノキシエタノール・BG	ヒマツリ油・ハイドロキシヒマツリ油・ハマメリスク水・カンテン・コムギ胚芽油・アボカド油・ソウハクヒエキス・アスパラガスリネアリスエキス・カオリ・ベントナイト・セラニウム油・フェノキシエタノール・ベンチレングリコール・ココイルアルギニンエチルPCA	水・ハイドロキシヒマツリ油・ハマメリスク水・カンテン・セニアオイ花エキス・マロニエエキス・オウゴン根エキス・ソウハクヒエキス・コムギ胚芽油・レンチン・ブチケン油・甘草フラボノイド・アボカド油・ローズ油・フェノキシエタノール・ココイルアルギニンエチルPCA	
用法用量	シャンプーを充分すすいで後、髪全体になじませます。2~3分程時間置いてから洗い流すと効果的です。	髪と頭皮をお湯で充分すすいでから、適量を手に取り泡立て、やさしく洗います。	大さじ1杯程度を手にとり、顔全体になじませたら、ティッシュまたは蒸しタオルでやさしく拭きとります。	たっぷりの量をコットンに含ませ、お肌がひんやりするまでやさしくパッティングします。	指がなめらかにするべく、いたっぷりと顔にのせ、やさしくマッサージ。(量は小さじ2~3杯が目安です)	大さじ1~2杯分を手にとり顔全体にのせ、15~20分程度おき、蒸しタオルでやさしく拭きとります。	小さじ1杯程度を手にとり、顔全体になじませます。
届出日	平成17年12月6日	平成17年12月6日	平成17年8月19日	平成17年8月19日	平成17年8月19日	平成17年8月19日	平成17年8月19日

健康食品

製品名	ジンジャータブレット■	華蓮■	華蓮タブレット■
種別	ジンジャー(しょうが)抽出物含有食品	乳酸発酵ハニーラタケ加工食品(顆粒)	乳酸発酵ハニーラタケ加工食品(タブレット)
性状	黄色	浅黄茶色～黄茶色	浅黄茶色～黄茶色
表示成分	澱粉分解物、ミルクカルシウム(乳成分を含む)、結晶セルロース、ジンジャー(しょうが)抽出物、レンチン(大豆由来)、ステアリン酸Ca	乳酸発酵ハニーラタケ粉末	ハニーラタケパウダー、ピフィズス菌、乳酸菌、コラーゲンペプチド等
お召し上がり方	1日3～6粒を目安に白湯または水でお召し上がりください。	1日1～2包を目安に白湯または水でお召し上がりください。	1日5～8粒を目安に白湯または水でお召し上がりください。

食品添加物製剤

製品名	イマジーンZ■	エプールAL65■
性状	無色の液体で、においがないか又はわずかに塩素のにおいがある。	無色透明の液である。
成分	次亜塩素酸ナトリウム、pH調整剤、水	エタノール、乳酸、グリシン、食品香料、水
用途	室内、厨房、トイレ等の除菌・消臭	調理用具、調理機器類の除菌や食品の品質保持

衛生雑貨品

デリケートS うるおいゼリー■	ジューシーラブ■
無色透明～半透明のゼリー状で、わずかに特異なにおいがある。	白色の軟膏剤で、ラベンダーのほのかな香りがする。
ヒドロキシエチルセルロース、グリセリン、PG、pH調整剤、パラベン、炭酸水素Na、コラーゲン、ヒアルロン酸Na、水	パルミチン酸セチル、トコフェロル酢酸エステル、アラントイン、パラベン、Iメントール、ラベンダー油、ワセリン、ステアリン酸ブチル、セタノール
潤滑剤、ボディマッサージ	潤滑剤

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。