

承認リスト(医薬品、医薬部外品、化粧品、健康食品)

万協製薬株式会社

医薬品	医薬部外品	化粧品……………	健康食品……
皮膚軟化薬……………	薬用化粧品……………	39	43
みずむし・たむし用薬……………	消毒剤……………		
外用鎮痛消炎薬……………	薬用化粧品……………		食品添加物製剤 44
外用鎮痒消炎薬……………	口中清涼剤……………		衛生雑貨品… 44
外用痔疾用薬……………	腋臭防止剤……………		
うがい薬・歯科口腔用薬……………	薬用歯みがき類……………		
化膿性疾患用薬……………	き避剤……………		
にきび治療薬……………	浴用剤……………		
殺菌消毒薬……………	シャンプー……………		
ひび・あかぎれ用薬……………	てんか粉類……………		
瀉下薬……………			
消化器官用薬……………			
その他 育毛剤……………			
鼻炎用点鼻薬……………			
ビタミン主薬製剤……………			
呼吸器官用薬……………			

※太線囲みは新規申請又は新規承認品目

皮膚軟化薬1

販売名	ヒロインクリームα	ヒロイン乳液α	エプール20DX	ヒロインクリーム■	ヒロインローション	ヒロイン乳液■
リスク分類	2	2	3	2	2	2
性状	w/o型クリーム剤	ローション剤	o/w型クリーム剤	w/o型クリーム剤	外用液剤	ローション剤
成分分量	100g中	100g中	100g中	100g中	100g中	100g中
	へパリン類似物質 0.3g アラントイン 0.2g トコフェロール酢酸エステル 0.5g	へパリン類似物質 0.3g アラントイン 0.2g トコフェロール酢酸エステル 0.5g	尿素 20.0g トコフェロール酢酸エステル 0.5g グリチルリチン酸一アンモニウム 0.5g パンテノール 1.0g	へパリン類似物質 0.3g	へパリン類似物質 0.3g	へパリン類似物質 0.3g
効能効果	乾皮症、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、小児の乾燥性皮膚、手指の荒れ、手足のひび、あかぎれ、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざの後のはれ・筋肉痛・関節痛	乾皮症、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、小児の乾燥性皮膚、手指の荒れ、手足のひび、あかぎれ、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざの後のはれ・筋肉痛・関節痛	手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌	手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、傷・火傷のあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打ち身・捻挫後のはれ・筋肉痛・関節痛	手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、傷・火傷のあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打ち身・捻挫後のはれ・筋肉痛・関節痛	手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、傷・火傷のあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打ち身・捻挫後のはれ・筋肉痛・関節痛
用法用量	1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼ等にのぼして貼ってください。	1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼ等にのぼして貼ってください。	1日数回適量を患部に塗擦する。	1日1～数回、適量を患部に擦り込むか、又はガーゼ等にのぼして貼る。	1日1～数回、適量を患部に擦り込むか、又はガーゼ等にのぼして貼る。	1日1～数回、適量を患部に擦り込むか、又はガーゼ等にのぼして貼る。
承認日	令和3年3月30日	令和3年10月6日	令和3年10月6日	令和2年11月10日	2019/7/31申請	令和2年11月10日
一物多名称	ヒロイゼクリームα	ヒロイゼ乳液α	エフカイ20DX	ヒケロインクリーム■	ヒケロインローション	ヒケロイン乳液■
	へパロイドクリームα■	へパロイド乳液α■	オノフェ20DX	ヒケロイドクリーム	ヒケロイドローション	ヒケロイド乳液■
	ヒルトベールα		ヒフェール20DX■	ヒロイゼクリーム	ヒロイゼローション	ヒロイゼ乳液
	ヒルトリアα			へパロイドクリーム	へパロイドローション■	へパロイド乳液
	リヘアプロHPプラス			へパロインクリーム		へパロイン乳液
				ヒルトベールクリーム		ヒルトベール乳液

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

皮膚軟化薬2

販売名	ヒールHPソフトクリーム	ヒールHPソフトローション■	ヒールHPソフトクリームα	ヒールHPソフトローションα	ヒールHPクリーム■	デオフランカクリーム20	デオフランカ乳状液20■
リスク分類	2	2	2	2	2	3	3
性状	クリーム	クリーム	クリーム	ローション	クリーム	クリーム	乳剤
成分分量	100g中	100g中	100g中	100g中	100g中	100g中	100g中
	ヘパリン類似物質 0.3g ジフェンヒドラミン 1.0g	ヘパリン類似物質 0.3g ジフェンヒドラミン 1.0g	ヘパリン類似物質 0.3g トコフェロール酢酸エステル 0.5g アラントイン 0.2g ジフェンヒドラミン 1.0g	ヘパリン類似物質 0.3g トコフェロール酢酸エステル 0.5g アラントイン 0.2g ジフェンヒドラミン 1.0g	ヘパリン類似物質 0.3g	尿素 20.0g ジフェンヒドラミン塩酸塩 1.0g グリチルレチン酸 0.3g	尿素 20.0g ジフェンヒドラミン塩酸塩 1.0g グリチルレチン酸 0.3g
効能効果	かゆみを伴う乾燥性皮膚 (老人・成人の乾皮症、小 児の乾燥性皮膚)	かゆみを伴う乾燥性皮膚 (老人・成人の乾皮症、小 児の乾燥性皮膚)	かゆみを伴う乾燥性皮膚 (老人・成人の乾皮症、小 児の乾燥性皮膚)	かゆみを伴う乾燥性皮膚 (老人・成人の乾皮症、小 児の乾燥性皮膚)	手指の荒れ、ひじ・ひざ・ かかと・くるぶしの角化 症、手足のひび・あかざ れ、乾皮症、小児の乾燥 性皮膚、しもやけ(ただれ を除く)、きず・やけどのあ との皮膚のしこり・つっぱ り(顔面を除く)、打身・ねん ざ後のはれ・筋肉痛・関節 痛	かゆみをともなう乾燥性 皮膚(成人・老人の乾皮 症)	かゆみをともなう乾燥性 皮膚(成人・老人の乾皮 症)
用法用量	1日1～数回、適量を患部 に塗布	1日1～数回、適量を患部 に塗布	1日1～数回、適量を患部 に塗布	1日1～数回、適量を患部 に塗布	1日1～数回、適量を患部 にすりこむか、又はガーゼ などにのばして貼る。	1日数回、適量を患部に 塗擦する。	1日数回、適量を患部に 塗擦する。
承認日	平成27年7月29日	平成27年9月18日	平成27年7月29日	平成27年9月18日	平成24年7月4日	平成18年3月3日	平成18年3月3日
一物多名称	エフカイHPソフトクリーム	エフカイHPソフトローション			ラウマーHPクリーム■	エプールクリーム20	エプール乳状液20
	オノフェHPソフトクリーム	オノフェHPソフトローション			ラホヤHPクリーム	ハルムユークリーム20	ハルムユークリーム20
					エフカイHPクリーム	ヒールクリーム20	ヒール乳状液20■
					オノフェHPクリーム■	オノフェクリーム20■	オノフェ乳状液20■
					オノフェHPクリーム■	ラウマークリーム20	オノフェ乳状液20■
					ラカノウHPクリーム	エフカイクリーム20	ラウマー乳状液20
					キルカミンHPクリーム■		エフカイ乳状液20
				デオフランカHPクリーム		ウレコート乳状液20■	

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

皮膚軟化薬3

販売名	パルムU■	アスコートAD乳液■	エプール20α■	アネシス20	ホルネフロスト	ウインターホルネ
リスク分類	2	2	3	3	3	3
性状	クリーム	乳剤	クリーム	クリーム	芳香の白色クリーム	芳香の白色軟膏
成分分量	100g中	100g中	100g中	100g中	1000mg中	100g中
	尿素 10.0g ジフェンヒドラミン塩酸塩 1.0g d-カンフル 1.0g リトカイン 2.0g トコフェロール酢酸エステル 0.3g	尿素 10.0g ジフェンヒドラミン塩酸塩 1.0g d-カンフル 1.0g リトカイン 2.0g トコフェロール酢酸エステル 0.3g	尿素 20.0g トコフェロール酢酸エステル 0.5g グリチルリチン酸モノアンモニウム 0.5g	尿素 20.0g	ビタミンA油 5.0mg トコフェロール酢酸エステル 10.0mg アラントイン 2.0mg グリチルリチン酸ジカリウム 5.0mg	トコフェロール酢酸エステル 2.0g グリチルリチン酸 0.3g ジパルミチン酸ヒドキシリン 0.2g アラントイン 0.2g
効能効果	かゆみをともなう乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚)	かゆみをともなう乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚)	手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌	手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌	皮膚の保護、手のあれ、肌あれ、ひび、しもやけ、あかぎれ	指先・手のひらの荒れ、かかとの荒れ、ひび、あかぎれ、しもやけ
用法用量	1日1～数回、適量を患部に塗布する。	1日1～数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗擦する。	1日数回適量を患部に塗擦する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日1～数回患部に塗布する。
承認日	平成11年1月28日	平成15年3月3日	平成14年7月9日	平成11年11月19日	昭和63年11月24日	昭和63年1月21日
一物多名称	ウレコート■	アスコートADローション■	パンパスα■	エプール20		
	ウレアルファ■	ハトマロンプレミアローション■	ウレコート20α■	アーシュ20		
	パンパスUX■	ウイスヘルプレミアローション■	ラホヤ20α■			
	ヒファールUX■	コンフラーージュプレミアローション■	エフカイ20α■			
	マンナUX■	パルムUローション■	リアス20α■			
	トラットUX	ウレアルファローション■	オノフェ20α■			
	アーシュUX■	エプールαローション	パルムユ-20α■			
		ウレコートローション■	ラウマー20α■			
		パンパスαローション	ラカナウ20α■			
		ヒファールローション	コクソス20α			
		アーシュローション■	ナルガ20α			
	マンナローション■	ブライル20α				
	トラットローション					

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

みずむし・たむし用薬1

販売名	ヒフォルTL水虫液 α	ヒフォルTL水虫クリーム α	ヒフォル水虫クリームLC	エフケンクリーム■	ヒフォルV8水虫液■	ヒフォルV8水虫クリーム■	ハンキーU10クリーム■
リスク分類	②	②	②	3	②	②	②
性状	液	クリーム	クリーム	クリーム	液	クリーム	クリーム
成分分量	100mL中	100g中	100g中	100g中	100mL中	100g中	100g中
		テルビナフィン塩酸塩 1.0g リドカイン 2.0g グリチルレチン酸 0.5g クロタミン 5.0g イソプロピルメチルフェノール 0.3g トメントール 2.0g	テルビナフィン塩酸塩 1.0g リドカイン 2.0g グリチルレチン酸 0.5g クロタミン 5.0g イソプロピルメチルフェノール 0.3g トメントール 2.0g 尿素 5.0g	ラノナゾール 1.0g ジフェンヒドรามミン塩酸塩 2.0g クロタミン 5.0g アラントイン 1.0g	ウンテンシレン酸 3.0g サリチル酸 4.0g 尿素 10.0g	プテナフィン塩酸塩 1.0g リドカイン 2.0g グリチルレチン酸 0.5g クロタミン 5.0g dl-カンフル 1.0g イソプロピルメチルフェノール 0.3g クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.5g トメントール 1.0g	プテナフィン塩酸塩 1.0g リドカイン 2.0g グリチルレチン酸 0.5g クロタミン 5.0g dl-カンフル 1.0g イソプロピルメチルフェノール 0.3g クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.5g トメントール 2.0g
効能効果	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	水虫、いんきんたむし、ぜにたむし
用法用量	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。
承認日	平成30年4月6日	平成30年4月6日	平成30年3月15日	平成29年4月28日	平成27年4月28日	平成27年4月28日	平成26年2月28日
一物多名称	エフォルTL水虫液 α	エフォルTL水虫クリーム α	エフォル水虫クリームLC	ヒフォル水虫クリーム	エフォルV8水虫液■	エフォルV8水虫クリーム■	エフォルU10クリーム■
	オノフェTL水虫液 α	オノフェTL水虫クリーム α			オノフェV8水虫液■	オノフェV8水虫クリーム■	オノフェU10クリーム
					ラウマーV8水虫液■	ラウマーV8水虫クリーム■	ラウマーU10クリーム■
					ラホヤV8水虫液	ラホヤV8水虫クリーム	キルカミンU10クリーム■
					キルカミンV8水虫液■	キルカミンV8水虫クリーム■	ラバルンU10クリーム

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

みずむし・たむし用薬2

販売名	ヒフォルV7水虫クリーム■	ヒフォルV7水虫液■	ヒフォルV水虫クリーム	ヒフォルV水虫液	キンメルBTクリーム■	キンメルBT液■	ヒフォルB水虫スプレー
リスク分類	②	②	②	②	②	②	②
性状	クリーム	液	クリーム	液	クリーム	液	スプレー
成分分量	100g中	100mL中	100g中	100mL中	100g中	100ml中	100ml中
	ブテナフィン塩酸塩 1.0g リドカイン 2.0g グリチルレチン酸 0.2g クロタミン 3.0g dl-カンフル 1.0g イソプロピルメチルフェノール 0.3g クロルフェニラミン酸塩 0.5g	ブテナフィン塩酸塩 1.0g リドカイン 2.0g グリチルレチン酸 0.2g クロタミン 3.0g dl-カンフル 1.0g イソプロピルメチルフェノール 0.3g クロルフェニラミン酸塩 0.5g	ブテナフィン塩酸塩 1.0g リドカイン 2.0g グリチルレチン酸 0.5g クロタミン 5.0g dl-カンフル 1.0g	ブテナフィン塩酸塩 1.0g リドカイン 2.0g グリチルレチン酸 0.5g クロタミン 5.0g dl-カンフル 1.0g	ブテナフィン塩酸塩 1.0g リドカイン 2.0g グリチルレチン酸 0.5g クロタミン 5.0g dl-カンフル 1.0g	ブテナフィン塩酸塩 1.0g	ブテナフィン塩酸塩 1.0g
効能効果	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし
用法用量	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。
承認日	平成25年4月5日	平成25年3月27日	平成21年3月4日	平成21年3月4日	平成19年3月16日	平成19年3月16日	H18.8.10申請
一物多名称	エフォルV7水虫クリーム	エフォルV7水虫液	エフォルV水虫クリーム	エフォルV水虫液	ヒフォルB水虫クリーム■	ヒフォルB水虫液■	
	オノフェV7水虫クリーム■	オノフェV7水虫液■	オノフェV水虫クリーム■	オノフェV水虫液■	エフォルB水虫クリーム	エフォルB水虫液	
	ラウマーV7水虫クリーム■	ラウマーV7水虫液■	ラウマーV水虫クリーム■	ラウマーV水虫液■	オノフェB水虫クリーム■	オノフェB水虫液■	
	ラホヤV7水虫クリーム	ラホヤV7水虫液	ラホヤV水虫クリーム■	ラホヤV水虫液■	ラウマーB水虫クリーム	ラウマーB水虫液	
	キルカミンV7水虫クリーム■	キルカミンV7水虫液■	キルカミンV水虫クリーム■	キルカミンV水虫液■	テオプランカB水虫クリーム	テオプランカB水虫液	
					ラホヤB水虫クリーム■	ラホヤB水虫液■	
					ラカナウB水虫クリーム	ラカナウB水虫液	
					キルカミンB水虫クリーム	キルカミンB水虫液	

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

みずむし・たむし用薬3

販売名	ヒフォルTL水虫クリーム	ヒフォルTL水虫液	ヒフォルTL水虫スプレー	ユンカークリームA■	ユンカー液A■	ハイエック水虫スプレーTF■	ヒフォルLAクリーム
リスク分類	②	②	②	②	②	②	②
性状	クリーム	液	スプレー	クリーム	液	スプレー	クリーム
成分分量	100g中	100mL中	100mL中	100g中	100mL中	100g中	100g中
	テルビナフィン塩酸塩 1.0g リトカイン 2.0g	テルビナフィン塩酸塩 1.0g リトカイン 2.0g	テルビナフィン塩酸塩 1.0g リトカイン 2.0g	テルビナフィン塩酸塩 1.0g	テルビナフィン塩酸塩 1.0g	テルビナフィン塩酸塩 1.0g	ラノナゾール 1.0g
効能効果	みずむし、いんきんたむし、 ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、 ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、 ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、 ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、 ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、 ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、 ぜにたむし
用法用量	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に噴霧する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に噴霧する。	1日1回、適量を患部に塗布する。
承認日	平成20年3月28日	平成20年3月28日	H19.6.29申請	平成19年4月4日	平成19年4月4日	H18.3.27申請	平成23年4月11日
一物多名称	エパールTL水虫クリーム	エパールTL水虫液	エパールTL水虫スプレー	ヒフォルT水虫クリーム■	ヒフォルT水虫液■		エパールLAクリーム
	オノフェTL水虫クリーム	オノフェTL水虫液	オノフェTL水虫スプレー	エパールT水虫クリーム■	エパールT水虫液■		オノフェLAクリーム
	ラウマーTL水虫クリーム	ラウマーTL水虫液	ラウマーTL水虫スプレー	オノフェT水虫クリーム■	オノフェT水虫液■		キルカミンLAクリーム
	デオプランカTL水虫クリーム	デオプランカTL水虫液	デオプランカTL水虫スプレー	ラウマーT水虫クリーム	ラウマーT水虫液		
	ラホヤTL水虫クリーム	ラホヤTL水虫液	ラホヤTL水虫スプレー	デオプランカT水虫クリーム	デオプランカT水虫液		
	ラカナウTL水虫クリーム	ラカナウTL水虫液	ラカナウTL水虫スプレー	ラホヤT水虫クリーム	ラホヤT水虫液		
	キルカミンTL水虫クリーム	キルカミンTL水虫液	キルカミンTL水虫スプレー	ラカナウT水虫クリーム	ラカナウT水虫液		
				キルカミンT水虫クリーム	キルカミンT水虫液		

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

みずむし・たむし用薬4

販売名	ヒフォルLA液	ヒフォルL水虫クリーム	ヒフォルL水虫液	キンメルLクリーム■	キンメルL液■	キンメルLスプレー■	ハイトスキン水虫チンキ■
リスク分類	②	2	2	2	2	2	2
性状	液	クリーム	液	クリーム	液	スプレー	淡黄色澄明液体
成分分量	100mL中	100g中	100mL中	100g中	100mL中	100mL中	100mL中
	ラノゾール 1.0g	ヒノゾール 1.0g リドカイン 2.0g ジフェンヒドラン塩酸塩 0.5g グリチルレチン酸 0.5g ベンザルコニウム塩化物 0.05g l-メントール 2.0g	ヒノゾール 1.0g リドカイン 2.0g ジフェンヒドラン塩酸塩 0.5g グリチルレチン酸 0.5g ベンザルコニウム塩化物 0.05g l-メントール 2.0g	ミコナゾール硝酸塩 1.0g クロタミン 10.0g リドカイン 2.0g グリチルレチン酸二カリウム 0.5g 尿素 3.0g	ミコナゾール硝酸塩 1.0g クロタミン 10.0g リドカイン 2.0g グリチルレチン酸二カリウム 0.5g l-メントール 1.0g	ミコナゾール硝酸塩 1.0g クロタミン 10.0g リドカイン 2.0g グリチルレチン酸二カリウム 0.5g l-メントール 1.0g	クロトリマゾール 1.0g グリチルレチン酸 0.2g ジフェンヒドラン塩酸塩 0.5g ムクゲ皮 12.0ml 尿素 5.0g
効能効果	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	水虫、いんきんたむし、ぜにたむし	水虫、いんきんたむし、ぜにたむし	水虫、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし
用法用量	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1回、適量を患部に塗布する。	1日1～2回、適量を患部に塗布する。	1日1～2回、適量を患部に塗布する。	1日1～2回、適量を患部に噴霧する。	1日2～3回、適量を患部に塗布する。
承認日	平成23年4月11日	平成17年6月15日	平成26年8月18日	平成15年1月30日	平成15年1月30日	平成15年1月30日	平成14年1月31日
一物多名称	エパールLA液	ラウマーL水虫クリーム	ラウマーL水虫液	ローレンミコナクリーム■	ローレンミコナ液■		
	オノフェLA液	オノフェL水虫クリーム	オノフェL水虫液	ヒフォル水虫クリームMC■	ヒフォル水虫液MC■		
	キルカミンLA液	エファカIL水虫クリーム	エファカIL水虫液	エパール水虫クリームMC	エパール水虫液MC		
		シンタコL水虫クリーム	シンタコL水虫液	オノフェ水虫クリームMC	オノフェ水虫液MC		
		エパールL水虫クリーム	エパールL水虫液	ラウマー水虫クリームMC	ラウマー水虫液MC		

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

みずむし・たむし用薬5

販売名	ハイトスキン水虫軟膏■	ローレンクマクリーム■	ローレンクマ液■	タキヤ水虫軟膏■	スーパーローレン液	タキヤ水虫液■	新ローレン液
リスク分類	2	2	2	3	2	2	2
性状	淡黄色ゲル状軟膏	白色のクリーム	芳香の無色澄明の液	芳香の白色軟膏	芳香の淡黄色澄明の液	芳香の澄明無色の液	芳香の淡黄褐色の液
成分分量	100g中	100g中	100ml中	100g中	100ml中	100ml中	100ml中
	クロトリマゾール 1.0g グリチルレチン酸 0.2g ジフェンヒドラミン 0.5g ムクゲ皮 12.0ml	クロトリマゾール 1.0g クロタトシト 5.0g リドカイン 2.0g グリチルレチン酸 0.5g	クロトリマゾール 1.0g クロタトシト 5.0g リドカイン 2.0g グリチルレチン酸 0.5g	ジフェンヒドラミン 0.5g ウンデシレン酸 3.0g ウンデシレン酸亜鉛 5.0g グリチルレチン酸 0.5g	トルナフテート 1.0g ウンデシレン酸 3.0g サリチル酸 2.0g ジブカイン塩酸塩 0.2g グリチルレチン酸 0.2g	トルナフテート 1.0g ウンデシレン酸 3.0g サリチル酸 2.0g ジブカイン塩酸塩 0.2g グリチルレチン酸 0.2g	チアントール 12.0g トルナフテート 2.0g グリチルレチン酸 0.2g
効能効果	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし	水虫、ぜにたむし、いんきんたむし	水虫、ぜにたむし、いんきんたむし	水虫、ぜにたむし、いんきんたむし	水虫、いんきんたむし、ぜにたむし
用法用量	1日2～3回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回患部に塗布または塗擦する。	1日2～3回患部に塗布する。	1日2～3回患部に塗布する。	1日2～3回患部に塗布する。
承認日	平成14年1月31日	平成2年4月18日	平成2年2月13日	昭和62年4月15日	昭和61年10月22日	昭和61年8月27日	昭和59年9月7日
一物多名称				スーパーローレン軟膏		カイザー液	

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

みずむし・たむし用薬6

販売名	新ローレン軟膏	デルムSパウダー	ローレンパールクリーム	ローレンパール軟膏	ローレンゴールド軟膏	ローレンゴールド液	ローレンローション
リスク分類	2	2	2	2	3	2	2
性状	芳香の淡黄褐色の軟膏	白色の散剤	淡黄色クリーム状軟膏	特異臭の白色軟膏	芳香の淡黄色軟膏	黄色透明芳香の液体	淡黄色澄明芳香の液体
成分分量	100g中	100g中	100g中	100g中	100g中	100mL中	100mL中
	チアントール 12.0g トルナフテート 2.0g グリチルレチン酸 0.5g	ウンデシレン酸亜鉛 10.0g サリチル酸ジフェニトドラミン 0.8g クロルヘキシジン塩酸塩 0.2g	チアントール 8.0g サリチル酸 3.0g テシット・デシチン 0.5g グリチルリチン酸ジカリウム 0.5g	チアントール 10.0g 酸化亜鉛 10.0g テシット・デシチン 1.0g グリチルリチン酸ジカリウム 1.0g	チアントール 8.0g イソプロピルメチルフェノール 3.0g デカリウム塩化物 0.3g ジフェニトドラミン 1.0g	チアントール 10.0g サリチル酸 8.0g クロロブタノール 1.0g メントール 0.2g カンフル 0.1g アマニ油 1.0g ロジン 0.5g	ウンデシレン酸 5.0g サリチル酸 8.0g β-グリチルレチン酸 0.05g 塩酸アルキルジアミノエチルグリシングリシン液 0.1g
効能効果	水虫、ぜにたむし、いんきんたむし	水虫、ぜにたむし、いんきん、たむし、はたけ、しらくも	みずむし、たむし、ぜにたむし、かいせん、しらくも	みずむし、たむし、ぜにたむし、かいせん	水虫、ぜにたむし、いんきん、たむし、しらくも	水虫、いんきんたむし、疥癬、乾癬、これらに起因する皮膚そう痒症	みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし
用法用量	1日2～3回患部に塗布又は塗擦する。	患部を清潔にした後、1日数回ふりかけてすり込む。予防には入浴後手足の指等にふりかけるか靴下の内部に散布する。	1日2～3回、患部を清潔にしたのち、適量を患部に十分にすり込む。	1日2～3回、患部を清潔にしたのち、適量を患部に十分にすり込む。または清潔な布、ガーゼにのばして患部に貼布する。	1日2～3回患部に塗布する。	1日数回、適宜量を患部に塗布する。	1日数回脱脂綿またはガーゼに浸して患部に塗布または清拭する。
承認日	昭和58年11月11日	昭和53年6月26日	昭和49年2月16日	昭和49年2月16日	昭和44年8月28日	昭和39年8月18日	昭和39年4月22日

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

外用鎮痛消炎薬1

販売名	ロキア-ジユG	ロキア-ジユL	ロキア-ジユC■	ヒフルFE液α■	ヒフルFEゲルα
リスク分類	1	1	1	2	2
性状	水性ゲル剤	外用液剤	o/w型クリーム剤	ローション剤	水性ゲル剤
成分分量	100g中 ロキソ [®] ロフェンナトリウム水和物 1.13g	100g中 ロキソ [®] ロフェンナトリウム水和物 1.13g	100g中 ロキソ [®] ロフェンナトリウム水和物 1.13g	100ml中 フェルビ [®] ナク 3.0g メントール 6.0g クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.1g ノナン酸 [®] パニルアミド 12.0mg	100g中 フェルビ [®] ナク 3.0g メントール 6.0g クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.1g ノナン酸 [®] パニルアミド 12.0mg
効能効果	関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)	関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)	関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)	肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫	筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛(五十肩など)、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲(うちみ)、捻挫
用法用量	1日3~4回、適量を患部に塗擦する。	1日3~4回、適量を患部に塗擦する。	1日3~4回、適量を患部に塗擦する。	1日2~4回、適量を患部に塗布する。	1日2~4回、適量を患部に塗布する。
承認日	2019/8/30申請	2019/8/30申請	2020/3/12申請	令和3年2月5日	2021/7/21申請
一物多名称	ロキエ [®] ールG	ロキエ [®] ールL	ロキエ [®] ールC	エ [®] ールFE液α	エ [®] ールFEゲルα
	ロキオ [®] ノフェG	ロキオ [®] ノフェL		オ [®] ノフェFE液α	オ [®] ノフェFEゲルα
	ロキトラッド [®] G	ロキトラッド [®] L			

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

外用鎮痛消炎薬2

販売名	ヒールZ液	ヒールZXゲル	ヒールZ液	ヒールZゲル	ヒールFEゲル3■	ヒールFE液2■	エールFEゲル2■
リスク分類	2	2	2	2	2	2	2
性状	液	ゲル	液	ゲル	ゲル	液	ゲル
成分分量	100g中	100g中	100g中	100g中	100g中	100ml中	100g中
	ジクロフェナクナトリウム 1.0g トメントール 3.0g	ジクロフェナクナトリウム 1.0g トメントール 3.0g	ジクロフェナクナトリウム 1.0g	ジクロフェナクナトリウム 1.0g	フェルビナク 3.0g トメントール 6.0g クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.1g	フェルビナク 3.0g トメントール 6.0g クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.1g	フェルビナク 3.0g トメントール 3.0g
効能効果	腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫	腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫	関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫	関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫	肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、関節痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫	肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、関節痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫	肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)
用法用量	1日3～4回適量を患部に塗布してください。ただし、塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。	1日3～4回適量を患部に塗布してください。ただし、塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。	1日3～4回適量を患部に塗布してください。ただし、塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。	1日3～4回適量を患部に塗布してください。ただし、塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。	1日2～4回、適量を患部に塗擦する。	1日2～4回、適量を患部に塗布する。	1日2～4回、適量を患部に塗擦する。
承認日	平成27年10月16日	平成27年10月16日	平成26年10月16日	平成26年10月16日	平成25年11月29日	平成24年3月5日	平成22年3月9日
一物多名称	エールZ液	エールZXゲル	エールZ液	エールZゲル	エールFEゲル3■	エールFE液2	オノフェゲル2
	オノフェZ液	オノフェZXゲル	オノフェZ液	オノフェZゲル	オノフェFEゲル3■	オノフェFE液2■	ラウマーFEゲル2
	ラウマーZ液	ラウマーZXゲル	ラウマーZ液	ラウマーZゲル	ラウマーFEゲル3	ラウマーFE液2	キルカミンFEゲル2
	ラホヤZ液	ラホヤZXゲル	ラホヤZ液	ラホヤZゲル	キルカミンFEゲル3	キルカミンFE液2	ヒールFEゲル2
	キルカミンZ液	キルカミンZXゲル	キルカミンZ液	キルカミンZゲル			シタコFEゲル2
	ラバルンZ液	ラバルンZXゲル	ラバルンZ液	ラバルンZゲル			ラホヤFEゲル2
							トロマFEゲル2
						エフカイFEゲル2	

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

外用鎮痛消炎薬3

販売名	ヒールFE液	ヒールFEゲル	ヒールメタシン1.0%液	ヒールメタシン1.0%ゲル	ラカナウ アロメタシンL	ラカナウ アロメタシンE	アリサメタシン液
リスク分類	2	2	2	2	2	2	2
性状	液	ゲル	液	ゲル	クリーム	クリーム	芳香の淡黄色澄明の液
成分分量	100ml中	100g中	100ml中	100g中	100g中	100g中	100ml中
	フェルピナク 3.0g トメントール 3.0g	フェルピナク 3.0g	インドメタシン 1.0g トメントール 3.0g	インドメタシン 1.0g トメントール 3.0g	インドメタシン 1.0g ※ラベンダーの香り	インドメタシン 1.0g ※ユーカリの香り	インドメタシン 0.75g トメントール 1.0g
効能効果	肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、関節痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫	筋肉痛、腰痛、関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫	筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫	筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫	肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫	肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫	筋肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫
用法用量	1日2～4回、適量を患部に塗布する。	1日2～4回、適量を患部に塗擦する。	1日4回を限度として適量を患部に塗布する。	1日4回を限度として適量を患部に塗布する。	1日4回を限度として適量を患部に塗擦する。	1日4回を限度として適量を患部に塗擦する。	1日4回を限度として、適量を患部に塗布する。
承認日	平成20年3月15日	平成20年9月9日	平成17年6月15日	平成26年7月31日	平成22年12月13日	平成22年12月13日	平成5年1月28日
一物多名称	エプールFE液	エプールFEゲル	ラウマーメタシン1.0%液	ラウマーメタシン1.0%ゲル	キルカミン アロメタシンL	キルカミン アロメタシンE	タンタンメタシン液
	オノフェFE液	オノフェFEゲル	オノフェメタシン1.0%液	オノフェメタシン1.0%ゲル			
	ラウマーFE液■	ラウマーFEゲル	エフカイメタシン1.0%液	エフカイメタシン1.0%ゲル			
	キルカミンFE液■	キルカミンFEゲル	シタコメタシン1.0%液	シタコメタシン1.0%ゲル			
	ラホヤFE液	シタコFEゲル	エプールメタシン1.0%液	エプールメタシン1.0%ゲル			
	トロマFE液	ラホヤFEゲル					
	エフカイFE液	トロマFEゲル					
	テオフランカFE液	エフカイFEゲル					
	テオフランカFEゲル						

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

外用鎮痒消炎薬1

販売名	ヒファールER液	ヒファールER軟膏	ヒファールHD	ヒファールHDスプレー	エプールVZ■	エプールVZクール■
リスク分類	2	2	2	2	2	2
性状	外用液剤	油脂性軟膏剤	外用液剤	外用液剤	o/w型クリーム剤	o/w型クリーム剤
成分分量	100mL中	100g中	100mL中	100mL中	100g中	100g中
	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g ジフェンヒドรามミン塩酸塩 2.0g グリチルリチン酸二カリウム 0.3g l-メントール 1.0g	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g ジフェンヒドรามミン 1.0g グリチルリチン酸 0.3g l-メントール 1.0g トコフェロール酢酸エステル 0.5g	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g ジフェンヒドรามミン塩酸塩 2.0g クロタミン 3.0g グリチルリチン酸二カリウム 1.0g アラントイン 0.2g イソプロピルメチルフェノール 0.5g リドカイン 2.0g l-メントール 0.5g	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g ジフェンヒドรามミン塩酸塩 2.0g クロタミン 3.0g グリチルリチン酸二カリウム 1.0g アラントイン 0.2g イソプロピルメチルフェノール 0.5g リドカイン 2.0g l-メントール 0.5g	ジフェンヒドรามミン塩酸塩 2.0g グリチルリチン酸 1.0g イソプロピルメチルフェノール 0.5g リドカイン 2.0g トコフェロール酢酸エステル 2.0g	ジフェンヒドรามミン塩酸塩 2.0g グリチルリチン酸 1.0g イソプロピルメチルフェノール 0.5g リドカイン 2.0g トコフェロール酢酸エステル 2.0g l-メントール 0.5g
効能効果	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ
用法用量	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。
承認日	2021/5/14申請	2021/3/23申請	令和3年8月23日	2020/12/23申請	令和3年6月16日	令和3年6月16日
一物多名称	エプールER液■	エプールER軟膏	エプールHD	エプールHDスプレー	エフカイVZ	エフカイVZクール
	オノフェER液	オノフェER軟膏	オノフェHD		ヒファールVZ	ヒファールVZクール
		エフカイER軟膏	エフカイHD		キルカミンVZ	ラホヤVZクール
		ミン軟膏			バンキーVZ	オノフェVZクール

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

外用鎮痒消炎薬2

販売名	ヒワールPVA11液■	ヒワールPVA11ゲル■	ヒワールPVA9液	ヒワールPVA9ゲル	ヒワールPVA8軟膏■	ヒワールPVA8クリーム■	ヒワールPVA8ローション
リスク分類	②	②	②	②	②	②	②
性状	液	ゲル	液	ゲル	軟膏	クリーム	乳液
成分分量	100mL中	100g中	100mL中	100g中	100g中	100g中	100g中
	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g
	ジフェンヒドรามイン塩酸塩 2.0g	ジフェンヒドรามイン塩酸塩 2.0g	ジフェンヒドรามイン塩酸塩 2.0g	ジフェンヒドรามイン塩酸塩 2.0g	ジフェンヒドรามイン塩酸塩 2.0g	ジフェンヒドรามイン塩酸塩 2.0g	ジフェンヒドรามイン塩酸塩 2.0g
	クロタミソ 5.0g	クロタミソ 5.0g	クロタミソ 5.0g	クロタミソ 5.0g	クロタミソ 5.0g	クロタミソ 5.0g	クロタミソ 5.0g
	グリチルリチン酸二カリウム 0.3g	グリチルリチン酸二カリウム 0.3g	グリチルリチン酸二カリウム 0.3g	グリチルリチン酸二カリウム 0.3g	グリチルリチン酸二カリウム 0.3g	グリチルリチン酸二カリウム 0.3g	グリチルリチン酸二カリウム 0.3g
	l-メントール 3.5g	l-メントール 3.5g	l-メントール 3.5g	l-メントール 3.5g	グリチルレチン酸 0.5g	グリチルレチン酸 0.5g	グリチルレチン酸 0.5g
	dl-カンフル 1.0g	dl-カンフル 1.0g	dl-カンフル 1.0g	dl-カンフル 1.0g	アラントイン 0.2g	アラントイン 0.2g	アラントイン 0.2g
	リドカイン 2.0g	リドカイン 2.0g	リドカイン 2.0g	リドカイン 2.0g	リドカイン 2.0g	リドカイン 2.0g	リドカイン 2.0g
	イソプロピルメチルフェノール 0.1g	イソプロピルメチルフェノール 0.1g	イソプロピルメチルフェノール 0.1g	イソプロピルメチルフェノール 0.1g	イソプロピルメチルフェノール 0.1g	イソプロピルメチルフェノール 0.1g	イソプロピルメチルフェノール 0.1g
	パンテノール 1.0g	パンテノール 1.0g	パンテノール 1.0g	パンテノール 1.0g			
サリチル酸グリコール 1.0g	サリチル酸グリコール 1.0g						
トコフェロール酢酸エステル 0.1g	トコフェロール酢酸エステル 0.1g						
効能効果	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん
用法用量	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗擦する。	1日数回、適量を患部に塗擦する。	1日数回、適量を患部に塗擦する。
承認日	平成29年9月29日	平成29年9月29日	平成26年2月24日	平成26年2月24日	平成26年9月29日	平成26年9月29日	平成25年10月23日
一物多名称	ラウマーPVA11液	ラウマーPVA11ゲル	ラウマーPVA9液	ラウマーPVA9ゲル	ラウマーPVA8軟膏■	ラウマーPVA8クリーム■	ラウマーPVA8ローション
	ラホヤPVA11液■	ラホヤPVA11ゲル■	ラホヤPVA9液■	ラホヤPVA9ゲル■	ラホヤPVA8軟膏	ラホヤPVA8クリーム■	ラホヤPVA8ローション
	エプールPVA11液■	エプールPVA11ゲル	エプールPVA9液■	エプールPVA9ゲル■	エフカイPVA8軟膏	エフカイPVA8クリーム	エフカイPVA8ローション
	パンキーPVA11液■	パンキーPVA11ゲル■	オノフェPVA9液	オノフェPVA9ゲル	オノフェPVA8軟膏	オノフェPVA8クリーム	オノフェPVA8ローション
	パンパスPVA11液■	パンパスPVA11ゲル■	エフカイPVA9液	エフカイPVA9ゲル	ラカナウPVA8軟膏■	ラカナウPVA8クリーム■	ラカナウPVA8ローション
			パンキーPVA9液	パンキーPVA9ゲル	キルカミンPVA8軟膏	キルカミンPVA8クリーム	キルカミンPVA8ローション
			パンパスPVA9液■	パンパスPVA9ゲル■	デオブランカPVA8軟膏	デオブランカPVA8クリーム	デオブランカPVA8ローション
			ナルガPVA9液	ナルガPVA9ゲル	エプールPVA8軟膏	エプールPVA8クリーム	エプールPVA8ローション
					ラハルンPVA8軟膏■	ラハルンPVA8クリーム■	ラハルンPVA8ローション
						ナルガPVA8クリーム	ナルガPVA8ローション
						モンルナPVA8ローション■	

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

外用鎮痒消炎薬3

販売名	ヒールEX液 α	ヒールEX液プラス	ヒールEXゲル ■	ヒールEXクリーム ■	ヒールEX液 ■	エールD軟膏	エールDクリーム
リスク分類	②	②	②	②	②	②	②
性状	液	液	ゲル	クリーム	液	軟膏	クリーム
成分分量	100ml中	100ml中	100g中	100g中	100ml中	100g中	100g中
	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g ジフェンヒドラン塩酸塩 2.0g クロタミン 3.0g グリチルリチン酸二カリウム 0.2g トメントール 3.5g リトカイン 1.0g イソプロピルメチルフェノール 0.1g アラントイン 0.2g	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g ジフェンヒドラン塩酸塩 2.0g クロタミン 5.0g トメントール 1.5g リトカイン 1.5g イソプロピルメチルフェノール 0.1g アラントイン 0.2g	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g ジフェンヒドラン塩酸塩 1.0g トメントール 3.5g dl-カンフル 1.0g クロタミン 5.0g イソプロピルメチルフェノール 0.1g	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g ジフェンヒドラン塩酸塩 1.0g トメントール 3.5g dl-カンフル 1.0g クロタミン 5.0g イソプロピルメチルフェノール 0.1g	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g ジフェンヒドラン塩酸塩 1.0g トメントール 3.5g dl-カンフル 1.0g イソプロピルメチルフェノール 0.1g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル 0.05g クロタミン 5.0g トコフェロール酢酸エステル 0.5g イソプロピルメチルフェノール 0.1g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル 0.05g クロタミン 5.0g トコフェロール酢酸エステル 0.5g イソプロピルメチルフェノール 0.1g
効能効果	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん	虫さされ、かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、じんましん、あせも	虫さされ、かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、じんましん、あせも	虫さされ、かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、じんましん、あせも	湿疹、皮膚炎、かぶれ、かゆみ、虫さされ、あせも、ただれ、じんましん	湿疹、皮膚炎、かぶれ、かゆみ、虫さされ、あせも、じんましん
用法用量	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。
承認日	平成27年2月20日	平成26年9月8日申請	平成23年1月28日	平成26年12月18日	平成21年2月9日	平成17年11月8日	平成17年11月8日
一物多名称	ラウマーEX液 α ■	エールEX液プラス	ラウマーEXゲル	ラウマーEXクリーム ■	ラウマーEX液	ヒールD軟膏	ヒールDクリーム
	ラホヤEX液 α		ラホヤEXゲル ■	ラホヤEXクリーム	ラホヤEX液 ■	エフカイド軟膏	エフカイドクリーム
	エールEX液 α		ラカナウEXゲル	ラカナウEXクリーム	ラカナウEX液	オノフェD軟膏	オノフェDクリーム
	オノフェEX液 α		キルカミンEXゲル	キルカミンEXクリーム	キルカミンEX液 ■		
	キルカミンEX液 α ■		デオプランカEXゲル	デオプランカEXクリーム	デオプランカEX液 ■		
	デオプランカEX液 α ■		エールEXゲル ■	エールEXクリーム	エールEX液 ■		
	エフカイドEX液 α ■				オノフェEX液		
	ハンキーEX液 α ■				シタコEX液		
					トロマEX液		
					エフカイドEX液		
				ハンキーEX液 ■			

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

外用鎮痒消炎薬4

販売名	キルカミンα■	キルカミンα液	オノフェS■	オノフェSP	ハンパストクリーム	ハンパスト軟膏	ペレトリアルファ2
リスク分類	②	②	2	2	②	②	②
性状	クリーム	液	クリーム	液	クリーム	軟膏	クリーム
成分分量	100g中	100ml中	100g中	100g中	100g中	100g中	100g中
	成分分量	ジフェンヒドรามミン塩酸塩 1.0g デキサメタゾン酢酸エステル 0.025g トメントール 3.5g dl-カンフル 1.0g クロタミン 5.0g イソプロピルメチルフェノール 0.1g	デキサメタゾン酢酸エステル 0.025g ジフェンヒドรามミン塩酸塩 1.0g トメントール 3.0g dl-カンフル 2.0g イソプロピルメチルフェノール 0.1g	リトカイン 2.0g トコフェロール酢酸エステル 0.3g ジフェンヒドรามミン塩酸塩 2.0g イソプロピルメチルフェノール 0.1g	ジブカイン塩酸塩 0.3g ジフェンヒドรามミン塩酸塩 2.0g ベンゼトニウム塩化物 0.1g	フレトニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g クロタミン 5.0g トコフェロール酢酸エステル 0.5g イソプロピルメチルフェノール 0.1g	フレトニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g クロタミン 5.0g トコフェロール酢酸エステル 0.5g イソプロピルメチルフェノール 0.1g
効能効果	かゆみ、湿疹、虫さされ、皮膚炎、かぶれ、じんましん、あせも、しもやけ	かゆみ、虫さされ、かぶれ、あせも、じんましん、湿疹、皮膚炎、しもやけ	かゆみ、かぶれ、湿疹、虫さされ、皮膚炎、じんましん、あせも、ただれ、しもやけ	かゆみ、かぶれ、湿疹、虫さされ、皮膚炎、じんましん、あせも、ただれ、しもやけ	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん
用法用量	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、患部に適量を塗布する。	1日数回、患部に適量を塗布（噴霧）する。	1日数回、適量を患部に塗擦する。	1日数回、適量を患部に塗擦する。	1日数回、適量を患部に塗布する。
承認日	平成17年6月23日	平成17年6月23日	平成16年10月5日	平成26年7月31日	平成15年3月3日	平成15年3月3日	平成14年5月22日
一物多名称	エパールα	エパールα液■	ラウマーS■	エパールSP	ヒワールTクリーム■	ヒワールT軟膏■	ハンパストD
	リアスα■	リアスα液	エパールS■	ラウマーSP	アージュTクリーム	ラウマーT軟膏	ヒワールA
	ラウマーα	ラウマーα液■	キルカミンS■	キルカミンSP	ラウマーTクリーム	ラホヤT軟膏	マンナクリーム
	オノフェα■	オノフェα液	エトラスα■	デオプランカSP	ラホヤTクリーム	オノフェT軟膏	
	エフカイα	エフカイα液	デオプランカS■		オノフェTクリーム	キルカミンT軟膏	
	ラホヤα	ラホヤα液	ラカナウス■		キルカミンTクリーム	エフカイT軟膏■	
			ラホヤS		エフカイTクリーム■		
			エフカイS		エフカイTクリーム■		
		シタコス					

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

外用鎮痒消炎薬5

販売名	ホルネデキサゲル	ヘレトナルファ■	ハルムローション	イクセムA	マリンホルネ	ホルネホワイト	アセモフィール■
リスク分類	②	②	2	②	②	②	2
性状	無色透明のゲル	芳香の白色クリーム	芳香の乳白色乳液	白色軟膏	芳香の淡青白色乳液	芳香の白色軟膏	軟膏
成分分量	100g中	100g中	100g中	100g中	100g中	100g中	100g中
	デキサメタゾン酢酸エステル 0.025g クロタトロン 5.0g イソプロピルメチルフェノール 0.1g	デキサメタゾン酢酸エステル 0.025g ジブカイン塩酸塩 0.3g ジフェンヒドรามミン 0.5g グリチルレチン酸 0.5g サリチル酸メチル 2.5g l-メントール 1.0g dl-カンフル 1.5g	ジブカイン塩酸塩 0.3g ジフェンヒドรามミン 1.0g グリチルレチン酸 0.2g イソプロピルメチルフェノール 0.1g アラントイン 0.2g	ヒドロコルチゾン酢酸エステル 0.5g ジフェンヒドรามミン塩酸塩 0.5g グリチルレチン酸 0.5g クロルヘキシジン塩酸塩 0.2g 酸化亜鉛 2.0g	デキサメタゾン酢酸エステル 0.025g 酸化亜鉛 1.5g グリチルレチン酸 0.3g イソプロピルメチルフェノール 0.1g	デキサメタゾン酢酸エステル 0.025g ジフェンヒドรามミン 0.5g グリチルレチン酸 0.3g 酸化亜鉛 10.0g	酸化亜鉛 20.0g ジフェンヒドรามミン 1.0g リドカイン 1.0g グリチルレチン酸 0.2g アラントイン 0.5g イソプロピルメチルフェノール 0.1g トコフェロール酢酸エステル 1.0g ハツカ油 0.5g
効能効果	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん
用法用量	1日2～3回、適量を患部に塗布または塗擦する。	1日数回、適量を患部に塗布または塗擦する。	1日数回塗布又は塗擦する。	1日2～3回患部に塗布する。	1日1～数回患部に塗布または塗擦する。	1日2～3回適量を患部に塗布または塗擦する。	1日数回、適量を患部に塗擦する。
承認日	平成4年11月13日	平成4年1月21日	平成2年10月25日	昭和63年2月8日	昭和62年12月4日	昭和62年12月4日	平成27年3月26日
一物多名称				ハイトロバンパス			アセモフィール■
							アセモノフェ
							アセモラウマー
							アセモラホヤ
							アセモバンキー■

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

外用鎮痒消炎薬6

販売名	アセモタミ■	ヒールUFクリーム■	アセモテマス■	協和アセモ軟膏■	タキヤパンパス軟膏	ペレコーチH軟膏	ペレトN
リスク分類	②	2	2	②	②	②	2
性状	軟膏	クリーム	白色芳香の軟膏	白色軟膏	芳香の白色軟膏	芳香の白色軟膏	芳香の白色軟膏
成分分量	100g中	100g中	100g中	100g中	100g中	100g中	100g中
	ヒトコルチゾン酢酸エステル 0.5g アミノ安息香酸エチル 2.0g トコフェロール酢酸エステル 0.5g 酸化亜鉛 30.0g	ウフェナマト 5.0g ジフェンヒドラミン 1.0g グリチルレチン酸 0.3g トコフェロール酢酸エステル 0.5g ペンゼトニウム塩化物 0.1g	アミノ安息香酸エチル 1.0g 酸化亜鉛 37.0g フェノール 0.5g ジフェンヒドラミン 1.0g	ヒトコルチゾン酢酸エステル 0.2g アミノ安息香酸エチル 0.3g サリチル酸メチル 1.0g クロルヘキシジン塩酸塩 0.1g ジフェンヒドラミン 0.5g 酸化亜鉛 5.0g	ヒトコルチゾン酢酸エステル 0.5g ジフェンヒドラミン塩酸塩 1.0g グリチルレチン酸 0.5g クロルヘキシジン塩酸塩 0.2g	ヒトコルチゾン酢酸エステル 0.5g ジフェンヒドラミン塩酸塩 1.0g グリチルレチン酸 0.5g クロルヘキシジン塩酸塩 0.2g	ジフェンヒドラミン 1.0g グリチルレチン酸 0.5g ジブカイン塩酸塩 0.3g サリチル酸メチル 4.8g l-メントール 4.0g dl-カンフル 3.0g
効能効果	あせも、かぶれ、かゆみ、湿疹、皮膚炎、じんましん、虫さされ、しもやけ	皮膚炎、湿疹、おむつかぶれ、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん	あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、しもやけ、湿疹、皮膚炎、じんましん	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん	かゆみ、かぶれ、虫さされ、じんましん、しもやけ、あせも、ただれ、湿疹
用法用量	1日2～3回、適量を患部に塗擦する。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日2～3回、患部に適量を塗布する。	1日2～3回、患部に塗布又は塗擦する。	1日数回患部に塗布または塗擦する。	1日数回患部に塗布または塗擦する。	1日数回、適宜量を患部に塗布するかまたは塗擦する。
承認日	平成3年5月14日	平成27年3月19日	昭和62年4月22日	昭和61年9月25日	昭和61年6月24日	昭和61年5月1日	昭和60年3月30日
一物多名称		エールUFクリーム■					
		オフェUFクリーム■					
		ハンキーUFクリーム■					

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

外用鎮痒消炎薬7

販売名	スキンヘルプ [®] 〈クリーム〉■	パンパスA軟膏〈万協〉	モンナ100■	ペレトンAクリーム	ニューアセモローション 「万協」	0.5%フレド [®] パンパス軟膏 「万協」	0.3%フレド [®] パンパス軟膏 「万協」
リスク分類	3	2	②	2	2	②	②
性状	白色軟膏	白色軟膏	淡紅色の懸濁液	芳香の白色軟膏	芳香の淡青白色乳液	白色無臭の軟膏	白色無臭の軟膏
成分分量	100g中	100g中	1,000ml中	100g中	100ml中	100g中	100g中
	クロタトニ 5.0g イソプロピルメチルフェノール 0.5g グリチルレチン酸 1.0g	グリチルレチン酸 2.0g クロルヘキシジン塩酸塩 0.1g	デキサメタゾン 0.25g カラミン 20.00g グルコン酸クロルヘキシジン液 1.00g	ジブカイン塩酸塩 0.3g ジフェンヒドラミン 2.0g テシット・デシチン 0.3g サリチル酸メチル 2.0g トメントール 1.0g カンフル 2.0g	酸化亜鉛 1.5g フェノール 0.5g テシット・デシチン 0.3g グリチルレチン酸ジカリウム 0.2g	フレド [®] ニゾロン 0.5g デカリニウム塩化物 0.3g テシット・デシチン 0.1g	フレド [®] ニゾロン 0.3g デカリニウム塩化物 0.2g テシット・デシチン 0.1g
効能効果	かゆみ、かぶれ、湿疹、虫さされ、じんましん、しもやけ、皮膚炎、あせも、ただれ	湿疹、皮膚炎、かぶれ、じんましん、ただれ	湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん	かゆみ、かぶれ、じんましん、虫さされ、接触性皮膚炎	あせも、ただれ、かぶれ、かみそりまけ、虫さされ、あせもに伴う感染症、汗臭の防止	急性慢性湿疹、脂漏性湿疹、小児湿疹、接触性皮膚炎、アトピー性皮膚炎、神経性皮膚炎、ストロルス蕁麻疹、皮膚・肛門・陰部そう痒症	急性慢性湿疹、脂漏性湿疹、小児湿疹、接触性皮膚炎、アトピー性皮膚炎、神経性皮膚炎、ストロルス蕁麻疹、皮膚・肛門・陰部そう痒症
用法用量	1日数回適量を患部に塗布又は塗擦する。	1日1～2回適量を患部に塗布するか、又はガーゼにのばして貼布する。	使用時によく振り混ぜて、1日2～3適量を患部に塗布する。	1日数回適量を患部に充分すり込む。	1日数回、用時よく振って適量を患部に塗布する。	1日3～4回少量を患部に軽く塗布する。	1日3～4回少量を患部に軽く塗布する。
承認日	昭和58年8月8日	昭和58年5月26日	昭和45年1月12日	昭和44年8月28日	昭和42年1月30日	昭和39年7月6日	昭和39年7月6日
一物多名称	ラウマーHクリーム						
	エパールHクリーム						
	エフカイトクリーム						

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

外用痔疾用薬1

販売名	ヒフォルHクリームEX	レーバンH軟膏Ex α	レーバンH坐剤Ex α
リスク分類	②	②	②
剤型	o/w型クリーム剤	軟膏	坐剤
成分分量	100g中	100g中	1個中
	リドカイン 3.0g ヒドロコルチゾン酢酸エステル 0.5g イソプロピルメチルフェノール 0.1g ジフェンヒドラミン塩酸塩 1.0g アラントイン 1.0g グリチルレチン酸 0.3g トコフェロール酢酸エステル 3.0g l-メントール 0.1g	プレドニゾン酢酸エステル 0.1g リドカイン 3.0g イソプロピルメチルフェノール 0.1g クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.2g アラントイン 1.0g グリチルレチン酸 0.3g トコフェロール酢酸エステル 3.0g l-メントール 0.1g	プレドニゾン酢酸エステル 1.0mg リドカイン 60.0mg イソプロピルメチルフェノール 2.0mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 4.0mg アラントイン 20.0mg グリチルレチン酸 6.0mg トコフェロール酢酸エステル 60.0mg l-メントール 10.0mg
効能効果	きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒	きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒	きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和
用法用量	1日1～3回、適量を肛門部に塗布する。	1日1～3回、適量を肛門部に塗布する。	成人(15歳以上)は、1回1個を1日1～3回、肛門内に挿入する。
承認日	2021/10/1申請	令和1年6月14日	令和1年6月14日
一物多名称	エフカイHクリームEX	ヒフォルH軟膏Ex α ■	ヒフォルH坐剤Ex α
	オノフェHクリームEX	エフカイH軟膏Ex α	エフカイH坐剤Ex α
		オノフェH軟膏Ex α ■	オノフェH坐剤Ex α ■
		ラホヤH軟膏Ex α	ラホヤH坐剤Ex α
		エプールH軟膏Ex α	エプールH坐剤Ex α
			ジシコウ坐薬S

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

外用痔疾用薬2

販売名	レーバンH軟膏EX■	レーバンH坐剤EX■	レーバンH注入軟膏EX■	ランキュラス注入軟膏■	レーバンH坐剤■	レーバンZ軟膏
リスク分類	②	②	②	②	②	②
性状	軟膏	坐剤	軟膏	軟膏	坐剤	軟膏
成分分量	100g中	1個中	1個中	100g中	1日量(2個)中	100g中
	リドカイン 3.0g	リドカイン 60.0mg	プレドニゾン酢酸エステル 1.0mg	プレドニゾン酢酸エステル 0.05g	ヒドコロチゾン酢酸エステル 10mg	プレドニゾン酢酸エステル 0.05g
	ヒドコロチゾン酢酸エステル 0.5g	ヒドコロチゾン酢酸エステル 5.0mg	リドカイン 60.0mg	リドカイン 3.0g	リドカイン 120mg	リドカイン 3.0g
	酸化亜鉛 4.0g	酸化亜鉛 80.0mg	クロルフェニラミン酸塩 4.0mg	アラントイン 1.0g	トコフェロール酢酸エステル 100mg	トコフェロール酢酸エステル 2.5g
	イソプロピルメチルフェノール 0.1g	イソプロピルメチルフェノール 2.0mg	アラントイン 20.0mg	トコフェロール酢酸エステル 2.5g	アラントイン 20mg	アラントイン 1.0g
	クロルフェニラミン酸塩 0.2g	クロルフェニラミン酸塩 4.0mg	イソプロピルメチルフェノール 2.0mg		グリチルレチン酸 40mg	グリチルレチン酸 0.5g
	アラントイン 1.0g	アラントイン 20.0mg	トコフェロール酢酸エステル 50.0mg		トメントール 18mg	
	グリチルレチン酸 0.3g	グリチルレチン酸 6.0mg				
トコフェロール酢酸エステル 3.0g	トコフェロール酢酸エステル 60.0mg					
効能効果	きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒	きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和	きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和	きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和	きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和	きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和
用法用量	1日1～3回、適量を肛門部に塗布する。	成人(15歳以上)1回1個を、1日1～3回、肛門内に挿入する。15歳未満は使用しないこと。	成人(15歳以上)は1回1個を、1日1～2回、ノズル部分を肛門内に挿入し、全量をゆっくり注入する。または1日1～3回、適量を肛門部に塗布する。なお、一度塗布に使用したものは、注入には使用しないこと。	成人(15歳以上)は1回1個を、1日1～2回、ノズル部分を肛門内に挿入し、全量をゆっくり注入する。または1日1～3回、適量を肛門部に塗布する。なお、一度塗布に使用したものは、注入には使用しないこと。	成人(15歳以上):1回1個を1日1～2回、肛門内に挿入する。	1日3回、適量を肛門部に塗布する。
承認日	平成29年6月7日	平成29年6月7日	平成29年6月7日	平成17年3月22日	平成6年7月26日	平成5年7月2日
一物多名称	ヒールH軟膏EX■	ヒールH坐剤EX	ヒールA注入軟膏EX	ヒールA注入軟膏	エールH坐剤	エールH軟膏
	エカイH軟膏EX■	エカイH坐剤EX	エカイA注入軟膏EX	エカイA注入軟膏	ヒールH坐剤	ヒールH軟膏
	オノフェH軟膏EX■	オノフェH坐剤EX■	オノフェA注入軟膏EX■	オノフェA注入軟膏■	エカイH坐剤	エカイH軟膏
	ラホヤH軟膏EX■	ラホヤH坐剤EX	ラホヤA注入軟膏EX	レーバンH注入軟膏■	オノフェH坐剤	オノフェH軟膏
	エールH軟膏EX■	エールH坐剤EX	エールA注入軟膏EX■	ラホヤA注入軟膏	レーバンG坐剤	
	ラウマーH軟膏EX■			キルガミンA注入軟膏		
	ラカナウH軟膏EX			エールA注入軟膏		
ハンキーH軟膏EX						

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

外用痔疾用薬3

販売名	レーパンW	レーパンH■	レーパンP軟膏「万協」	レーパン坐薬	レーパンGローション■	レーパンG軟膏■	レーパン■
リスク分類	2	②	2	2	2	2	2
性状	芳香の白色軟膏	芳香の白色軟膏	芳香の淡黄白色軟膏	軟カプセル剤	無色澄明発泡性芳香の液	芳香の白色軟膏	無色爽快な香りの液
成分分量	100g中	100g中	100g中	2カプセル中(2820mg中)	100ml中	100g中	100ml中
	アミノ安息香酸エチル 1.0g	ヒドロコチゾン酢酸エステル 0.25g	グリチルレチン酸 0.3g	β-グリチルレチン酸 40mg	ベンザルコニウム塩化物 0.05g	次硝酸ピスマス 10.0g	プロピレングリコール 3.00g
	リドカイン 2.0g	リドカイン 3.0g	アミノ安息香酸エチル 2.0g	ジブカイン塩酸塩 10mg	プロカイン塩酸塩 0.1g	アミノ安息香酸エチル 5.0g	ベンザルコニウム塩化物 0.005g
	クロルヘキシジン塩酸塩 0.2g	クロルヘキシジン塩酸塩 0.2g	クロルヘキシジン塩酸塩 0.1g	トコフェロール酢酸エステル 40mg	ナファゾリン塩酸塩 0.05g	ナファゾリン塩酸塩 0.02g	テニット・デシチン 0.10g
	グリチルレチン酸 0.4g	グリチルレチン酸 0.4g	オキソアミジン末 0.5g	アラントイン 10mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.05g	オキソアミジン 0.5g	
アラントインクロルヒドロキシアリウム 0.3g	アラントインクロルヒドロキシアリウム 0.3g	酸化亜鉛 5.0g			ヨークレシチン 0.5g		
					グリチルレチン酸 0.4g		
					酢酸d-α-トコフェロール 0.5g		
効能効果	痔による痛み・かゆみ・はれ・出血	痔による痛み・はれ・かゆみ・出血	次の場合の症状の緩和 いぼ痔、はれ痔、かゆ痔、切れ痔、出痔、痔出血	次の場合の症状の緩和 いぼ痔、はれ痔、かゆ痔、切れ痔、出痔、痔出血	いぼ痔、切れ痔、脱肛、肛門の裂創、肛門周囲炎、肛門部、外陰部のそう痒症	内痔核、外痔核、裂肛、脱肛、肛門湿疹、肛門そう痒、肛門潰瘍	肛門周囲炎、脱肛、肛門裂創、痔核、陰部そう痒症、男女陰部清浄
用法用量	1日1～3回適量を患部に塗布するか、またはガーゼにのばして貼布する。	1日1～3回適量を患部に塗布するか、またはガーゼにのばして貼付する。	1日1～2回適量をそのまま塗布するか、ガーゼにのばして貼布する。	1日1カプセル、1日1～2回、肛門内に挿入する。	脱脂綿またはガーゼに本液を浸して、1日数回患部を清拭するか、またはあん法する。	1日1～2回、適量をそのまま塗布するか、ガーゼにのばして貼布する。	脱脂綿又はガーゼに浸して1日数回患部を清拭する。
承認日	昭和60年10月16日	昭和60年9月26日	昭和57年8月21日	昭和53年2月17日	昭和45年3月18日	昭和41年8月22日	昭和36年6月10日

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

うがい薬・歯科口腔用薬1

製品名	イマジンうがい薬	リップペール	ヒファール口内炎軟膏■	ヒファールAC■	ファインスロート
リスク分類	3	3	②	1	3
性状	含嗽剤(液剤)	油脂性軟膏剤	白色の芳香の軟膏	白色の軟膏	赤褐色粘稠性の液
成分・分量	100ml中	100g中	100g中	100g中	100ml中
	ホピトノード7.0g	アラントイン 0.5g パンテノール 0.5g ピリトキシン塩酸塩 0.1g グリチルレチン酸 0.3g トコフェロール酢酸エステル 0.2g	トリアムシロニアセトリド 0.1g	アシクロビル 5.0g	ヨウ素 0.5g ヨウ化カリウム 1.0g
効能・効果	口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去	口唇のひびわれ、口唇のただれ、口唇炎、口角炎	口内炎(アフタ性)	口唇ヘルペスの再発(過去に医師の診断・治療を受けた方に限る)	のどの殺菌・消毒
用法・用量	1回、本剤2~4mlを水約60mlに薄めて、1日数回うがいしてください。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日1~数回、適量を患部に塗布する。	1日3~5回、適量を患部に塗布する。(唇やそのまわりにピリピリ、チクチクなどの違和感をおぼえたら、すぐに塗布する。)	1日数回ののどの粘膜面に噴射塗布して用いる。
承認日	令和3年7月15日	2020/9/23申請	平成28年1月20日	平成24年4月19日	平成7年1月13日
一物多名称	エフカイうがい薬	ユアリップ	エパール口内炎軟膏■	エパールAC	
	エパールうがい薬		オノフェ口内炎軟膏■	オノフェAC	
	パンキョーうがい薬		ラウマー口内炎軟膏■	ラウマーAC	
			ラホヤ口内炎軟膏	ラホヤAC	
			キルカミン口内炎軟膏■	キルカミンAC	
			デオブラカ口内炎軟膏	パンキーAC	
		ハンキー口内炎軟膏			

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

うがい薬・歯科口腔用薬2

製品名	クリアスロート	デンタルBBカプセル	うがいコンク	リップクリーム「万協」	デンタルSクリーム	デンタルビルクリーム■	デンタルクリーム■
リスク分類	3	3	2	3	2	②	2
性状	赤褐色粘稠性の液	硬カプセル剤	淡橙色半透明芳香の液体	白色の芳香の軟膏	淡紫色芳香の軟膏	淡緑色軟膏で芳香	白色の軟膏で芳香
成分・分量	1ml中	2カプセル中	1ml中	100g中	100g中	100g中	100g中
	ホピトニョート 4.5mg	リホフラビン 30mg ピリドキシン塩酸塩 100mg ニコチン酸アミド 60mg パントテン酸カルシウム 30mg オロチン酸 100mg	ヒピテングルコネート液 0.075ml ハッカ油 6mg ユーカリ油 1mg メントール 15mg	ジハルミチン酸ピリドキシン 0.5g イソプロピルメチルフェニール 0.05g メントール 0.05g	フェノール 0.1g クロルヘキシジン塩酸塩 0.3g アスレン 0.02g メントール 0.1g	プレドニゾロン 0.2g 塩化セチルピリジニウム 0.1g	ジブカイン塩酸塩 1.0g アミノ安息香酸エチル 0.3g 塩化セチルピリジニウム 0.1g メントール 0.1g
効能・効果	のどの炎症によるのどのあれ、のどの痛み、のどのはれ、のどの不快感、声がれ	口角炎、口唇炎、口内炎、舌炎、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、にきび、肌あれ「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」次の場合のビタミンB2B6の補給:肉體疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時	口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去	口唇乾燥症(ひびわれ、あれ)、口唇炎(ただれ)、口角炎(びらん)	口中のはれ、ただれ、切り傷、痛み	歯肉炎、歯根炎、口内炎、口角炎、口唇炎	虫歯、歯根炎、歯肉炎等による歯痛、歯槽膿漏、口内炎、口角炎
用法・用量	1日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布して用いる。	成人(15才以上)1回1カプセル 1日2回服用する。	1回、約0.25mlを水約80mlで薄めて、うがい液とし、1日数回うがいます。	1日数回、適量を口唇に塗布または塗擦する。	清潔な指先または脱脂綿に適当量(約0.2~0.5g)をつけて、1日2~3回歯茎をマッサージする。または炎症の部分に適当量を塗擦する。	1日数回、適当量を清潔な指先、又は脱脂綿につけて、患部に塗擦する。	1日数回、適量を清潔な指先、または脱脂綿につけて、患部に塗擦する。虫歯には、そのくぼみ並びに歯肉に塗布する。
承認日	平成6年7月22日	昭和63年8月1日	昭和54年11月8日	昭和44年12月19日	昭和44年9月3日	昭和39年7月6日	昭和39年3月13日

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

化膿性疾患用薬

製品名	紫雲膏ヒフォル■	ホルネF■	ネオ・テーマ	ダーマンS■	パンパス軟膏■	ホルネガーゼ「協励」
リスク分類	2	2	2	2	2	2
性状	軟膏	軟膏	淡桃色芳香の軟膏	白色軟膏	淡黄色、芳香の軟膏	無色で特異臭の薬液にガーゼを浸漬したもの
成分分量	1117g中	100g中	100g中	100g中	100g中	100g中
	シコン 120g トウキ 80g ゴマ油 1000g ミツロウ 300g 豚脂 30g	スルファジアジン 5.0g 酸化亜鉛 5.0g アラントイン 0.5g	酸化亜鉛 30.0g アミノ安息香酸エチル 1.5g 次没食子酸ビスマス 1.5g スルファジアジン 5.0g グリチルレチン酸 0.6g	スルファジアジン 5.0g 酸化亜鉛 5.0g ジフェンヒドラミン塩酸塩 0.5g dl-塩酸メチルエフェドリン 0.5g 卵黄油 0.5g	酸化亜鉛 6.0g フェノール 0.5g サリチル酸 0.1g イソプロピルメチルフェノール 0.05g ヨークレシチン 0.5g	サリチル酸 2.0g 龍腦 5.0g
効能効果	(一般用の場合) ひび、あかぎれ、しもやけ、魚の目、あせも、ただれ、外傷・火傷、痔の痛み (配置や向けの場合) ひび、あかぎれ、しもやけ、ただれ、軽微の外傷・火傷、痔の痛み	化膿性皮膚疾患(とびひ、めんちよう、毛のう炎)	とびひ、にきび、面ちよう、化膿性皮膚疾患	一般創傷、切傷、すり傷、化膿性疾患、急慢性湿疹、蕁麻疹、痒疹、毒虫刺傷、かぶれ、火傷、小児ストロルス	やけど、きりきず、すりきず、日やけ、しもやけ、ひび、あかぎれ、かぶれ、ただれ、よう、ちよう、くさ、ち	ねぶと、よう、ちよう、腫物
用法用量	適量を患部に塗布またはよく擦り込む、またはガーゼ・脱脂綿に塗布して患部に貼る。	1日数回、適量を患部に塗布するか、又はガーゼ等に延ばして貼る。	患部及びその周辺を清拭したのち、1日1~2回適量を塗布する。	1日2~3回適量をガーゼに延し、又は直接患部に塗擦又は塗布す。	1日2~3回患部に塗布又は貼用する。	1日数回本薬液に浸されたガーゼを患部に貼布する。
承認日	平成28年9月6日	平成15年3月20日	昭和52年11月14日	昭和45年12月2日	昭和39年2月22日	昭和37年2月24日
一物多名称	紫雲膏ナルガ	エパールG■				
	紫雲膏マユール	ヒフォルH■				
	紫雲膏テーマ	デオプランカF■				
		ラホヤF				
		ラウマーF■				
		キルカミンF				
	オノフェF■					

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

にきび治療薬

販売名	ヒフォルアクネスプレー	ラウマーアクネクリーム	ヒフォルアクネクリーム■
リスク分類	2	2	2
性状	ホンプスプレー剤	クリーム	クリーム
成分分量	100g中	100g中	100g中
	アラントイン 0.2g サリチル酸 0.5g エタノール 22.84g	イブ°プロフェンピ°コノール 3.0g イソ°ロピ°ルメチルフェノール 0.3g ※香料有り	イブ°プロフェンピ°コノール 3.0g イソ°ロピ°ルメチルフェノール 0.3g
効能効果	にきび	吹き出物、にきび	吹き出物、にきび
用法用量	1日2回(朝・晩)、適量を患部に噴霧する。顔には適量を手にとり塗布する。	1日数回、石けんで洗顔後、適量を患部に塗布する。	1日数回、石けんで洗顔後、適量を患部に塗布する。
承認日	2020/7/21申請	平成28年12月26日	平成24年9月13日
一物多名称	エパールアクネスプレー	キルカミンアクネクリーム	エパールアクネクリーム■
		エフカイクネクリーム	オノフェアクネクリーム
			ラカナウアクネクリーム■
			ナルガアクネクリーム
			ラバルンアクネクリーム

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

殺菌消毒薬1

販売名	手クア消毒液
リスク分類	3
剤型	消毒剤
成分分量	100mL中
	ベンゼトニウム塩化物 0.1g
効能効果	手指・皮膚の殺菌・消毒
用法用量	本品をそのまま手指・皮膚に塗擦するか、又はそのままガーゼ、脱脂綿等に浸して清拭する。
承認日	2021/10/6申請
一物多名称	手クイン消毒液

※販売名の後に■が付いているものは既発売品

殺菌消毒薬2

販売名	ヒフルAPローション	エプール消毒薬	ケーパイン消毒薬■	ホルネL	パンパスL	テープ軟膏
リスク分類	3	3	2	2	2	2
性状	液	液	液	無色澄明芳香の液	無色澄明の液	黄色軟膏
成分分量	100mL中	100mL中	100mL中	100mL中	100mL中	100g中
	ペンゼトニウム塩化物 0.01g グリチルリチン酸二カリウム 0.12g アラントイン 0.12g トコフェロール酢酸エステル 0.10g	ホピトニョード 10.0g	ジブカイン塩酸塩 0.1g ナファゾリン塩酸塩 0.1g クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.2g ベンザルコニウム塩化物 0.1g	ジブカイン塩酸塩 0.1g ナファゾリン塩酸塩 0.1g クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.2g ベンザルコニウム塩化物 0.1g	ジブカイン塩酸塩 0.1g ナファゾリン塩酸塩 0.1g クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.2g ベンザルコニウム塩化物 0.1g	ゲルコン酸クロルヘキシジン液 0.5ml クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.2g
効能効果	かき傷、創傷面の殺菌・消毒、とびひ・おでき等の感染皮膚面の消毒、きり傷、すり傷、さし傷、靴ずれ	切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、とびひ、おでき等の感染皮膚面の消毒	切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒	きり傷、すり傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾時の肛門の消毒	切傷、さし傷、かき傷、すり傷、靴ずれ、手指・創傷面の殺菌・消毒	外傷(切傷、すり傷、つき傷)、靴ずれ
用法用量	1日数回、適量を患部に塗布してください。	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回噴霧又はガーゼ・脱脂綿などに浸して塗布する。	1日数回、脱脂綿またはガーゼに浸して患部に塗布する。	1日数回脱脂綿またはガーゼに浸して患部を清拭する。	1日2乃至3回患部に適量を塗布する。
承認日	平成25年4月23日	平成17年10月24日	平成11年6月30日	昭和60年2月8日	昭和58年12月26日	昭和54年11月8日
一物多名称	エプールAPローション	ラウマー消毒薬	レーバングローション2■			
	エフカイAPローション	エフカイ消毒薬	キスクリア■			
	オノフェAPローション■	オノフェ消毒薬	パンパス消毒薬			
			ヒフル消毒薬			
			マンナ消毒薬			
			トラッド消毒薬			
		アージュ消毒薬				

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

ひび・あかぎれ用薬

販売名	ヒビヒール α ■	ヒビヒール ■	ヒールバン ■
リスク分類	3	3	3
性状	白色のクリーム	白色のクリーム	ローション
成分分量	100g中	100g中	100g中
	ビタミンA油 0.5g トコフェロール酢酸エステル 2.0g アラントイン 0.2g グリチルレチン酸 0.3g イソプロピルメチルフェノール 0.1g シンフェニトラミン 0.5g グリセリン 40.0g	トコフェロール酢酸エステル 2.0g イソプロピルメチルフェノール 0.1g l-メントール 1.35g dl-カンフル 9.6g サリチル酸メチル 3.0g	ピロキシリン 12.0g
効能効果	ひび・ひざ・かかとのあれ、ひび・あかぎれ、指先・手のひらのあれ、しもやけ	ひび、あかぎれ、しもやけ、かゆみ	ひび、あかぎれ、さかむけ、小さききず、すりきず
用法用量	1日数回、適量を患部に塗布する。	1日数回、適量を患部に塗布または塗擦する。	患部を清潔にし、傷部のみに適量を塗り、そのまま静かに乾燥させる。
承認日	平成29年10月12日	平成23年9月20日	平成23年10月18日
一物多名称	ヒビエール α	ヒビエール ■	ラホヤバン
	ヒビラウマー α ■	ヒビラウマー ■	ラカナウバン
	ヒビオノフェ α ■	ヒビオノフェ	エファイバン
	ヒビラホヤ α	ヒビラホヤ	パルムユーバン ■
	ヒビトロマ α	ヒビトロマ	テオブランカバン

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

瀉下薬

製品名	通源顆粒	通源細粒(協励)	通源細粒「協励」■	ツーケンC	通源「協励」
リスク分類	②	②	②	②	②
性状	淡黄緑褐色の顆粒	緑褐色の細粒	茶褐色の細粒	硬カプセル剤	濃緑褐色の粉末
成分・分量	1日量(2包)中	1日量(2包)中	1日量(4包)中	1日量(4カプセル)中	1日量(4包)中
	ダイオウ末 0.45g センナ末 0.75g シャクヤク末 0.40g カンゾウ末 0.40g	ダイオウ末 0.85g センナ末 0.75g シャクヤク末 0.40g カンゾウ末 0.40g	センナ末 1500mg ダイオウ末 800mg カンゾウ末 800mg シャクヤク末 800mg	ダイオウエキス 120mg カンゾウエキス 200mg シャクヤクエキス 80mg センノシト [®] 32mg	センナ末 1.5g ダイオウ末 0.8g カンゾウ末 0.8g シャクヤク末 0.8g
効能・効果	・便秘 ・便秘に伴う次の症状の緩和:頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔	・便秘 ・便秘に伴う次の症状の緩和:頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔	・便秘 ・便秘に伴う次の症状の緩和:頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔	・便秘 ・便秘に伴う次の症状の緩和:頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔	・便秘 ・便秘に伴う次の症状の緩和:頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔
用法・用量	大人(15才以上)1回1~2包 1日1回空腹時に服用すること。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量すること。	1.大入包装 大人(15歳以上)1回0.6~1.2g 11歳以上15歳未満1回0.4~0.8g 7歳以上11歳未満1回0.3~0.6g 1日2回、朝夕の空腹時服用すること。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量すること。2.分包品 大人(15歳以上)1回1/2~1包 11歳以上15歳未満1回1/3~2/3包 7歳以上11歳未満1/4~1/2包	1.分包剤 大人(15歳以上)1回1包~2包 1日2回 2.大入り剤 大人(15歳以上)1回1.31~2.62gを限度とし、なるべく空腹時に服用すること。服用間隔は4時間以上おくこと。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量すること。	大人(15才以上)1回1~2カプセルを、1日2回を限度とし、なるべく空腹時に服用すること。服用間隔は4時間以上おくこと。ただし、便秘の程度、状態には個人差があるので、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は、減量すること。	大人(15才以上)1回1包~2包 1日2回を限度とし、なるべく空腹時に服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。ただし、便秘の程度、状態には個人差があるので、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量すること。
承認日	平成6年9月28日	平成6年1月28日	昭和63年7月4日	昭和62年6月22日	昭和62年3月31日
一物多名称	新通源	スルーラン			
		ローヤル漢方便秘薬「細粒」			

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

消化器官用薬

製品名	強力パンジア「万協」	強力パールミックス「万協」	パールミックス「万協」	デコール「万協」
リスク分類	2	②	3	3
性状	淡褐色の粉末	淡黄褐色の粉末で芳香	淡黄色の粉末で特異臭	淡褐色の微粉末
成分・分量	3包中	3包中	3包中	1000g中
	炭酸水素ナトリウム 900mg 合成ビトロールサイト 1200mg 沈降炭酸カルシウム 822mg ロートエキス散 300mg ゲンチアナ末 180mg	DL-メチオニン 1.0g 塩酸チアミン 0.02g ビタミンB2 0.007g dl-塩酸メチルエフェドリン 0.05g クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.01g ニコチン酸アミド 0.03g パントテン酸カルシウム 0.02g	dlメチオニン 1.0g ビタミンB1 0.02g ビタミンB2 0.007g	デヒドロコロール酸 5.0g 胆汁末 250.0g
効能・効果	胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、吐き気(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)、胃痛	肝臓疾患、宿酔、黄疸、自家中毒、蕁麻疹、アレルギー性皮膚炎、にきび、しみ、口内炎、食餌中毒、つわり	肝臓疾患、黄疸、宿酔、自家中毒、つわり、蕁麻疹、急性慢性湿疹、アレルギー皮膚疾患、疲労回復、にきび、口内炎	消化不良、肝臓及び胆嚢機能障害、胆石痛、黄疸、胃痛、腹痛、蕁麻疹、つわり、胃酸過多、宿酔、急性慢性下痢、便秘
用法・用量	大人(15才以上)1回1包 11才以上15才未満 1回2/3包、8才以上11才未満 1回1/2包 5才以上8才未満 1回1/3包 いずれも1日3回食後に服用する。	1日3回適宜服用する。1回大人1包宛 15才未満7才まで1/2包 7才未満5才まで1/3包 5才未満2才まで1/6包 2才未満1/10包	1日3回適宜服用する。1回大人1包宛 15才未満7才まで1/2包 7才未満5才まで1/3包 5才未満2才まで1/6包 2才未満1/10包	一般症状には大人1回0.5g宛 1日3回食後服用 急性下痢胃痛には1回1.0g頓用 便秘には1日1回1.5～2.0g夕食後服用する。
承認日	昭和56年8月14日	昭和37年3月27日	昭和36年6月10日	昭和36年5月22日

その他

育毛剤

製品名	カミングアップ
リスク分類	2
剤型	外用液剤
成分分量	100mL中
	カルプロニウム塩化物 1.0g
	パントテニールエチルエーテル 1.0g
	ピリドキシン塩酸塩 0.05g
	ジフェニトロミン塩酸塩 0.1g
	サリチル酸 0.2g
	トメントール 0.3g
効能効果	発毛促進、育毛、脱毛(抜毛)の予防、若禿(壮年性脱毛症)、薄毛、ふけ、かゆみ、病後・産後の脱毛、枇糠性脱毛症、円形脱毛症
用法用量	1日2～3回適量を頭皮・頭髮にふりかけ、マッサージする。
承認日	2021/7/28申請
一物多名称	カミングアウト

鼻炎用点鼻薬

ヒフォルAL鼻炎スプレー	エフォルN点鼻薬
2	2
液	液
100ml中	100ml中
ケチフェンマル酸塩 0.0756g	ナファゾリン塩酸塩 0.05g
	クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.5g
	リドカイン 0.5g
	グリチルリチン酸二カルウム 0.3g
	ベンザルコニウム塩化物 0.02g
花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり	急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和:鼻づまり、鼻みず、くしゃみ、頭重づまり
成人(15歳以上)及び7歳以上の小児:1回に1度ずつ、1日4回(朝、昼、夕方及び就寝前)両鼻腔内に噴霧する。(1噴霧でケチフェンとして0.05mg)	成人(15歳以上)及び7歳以上の小児:1回1～2度ずつ、1日1～5回、鼻腔内に噴霧する。なお、適用間隔は3時間以上おこなうこと。
平成26年4月10日	平成17年6月28日
エフォルAL鼻炎スプレー	ヒフォルN点鼻薬 ■
エカイAL鼻炎スプレー	エカイN点鼻薬 ■
オフォルAL鼻炎スプレー	オフォルN点鼻薬 ■

ビタミン主薬製剤

ナチュリアEC
3
黄色の分包顆粒剤
1日量(3包)中
酢酸d-α-トコフェロール 300mg
アスコルビン酸 1000mg
L-アスコルビン酸ナトリウム 1124.7mg
酪酸リボフラビン 3mg
末梢血行障害による次の諸症状の緩和:肩・首筋のこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ 次の諸症状の緩和:しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着 次の場合の出血予防:歯茎からの出血、鼻出血 次の場合のビタミンECの補給:肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期
大人(15歳以上)1回1包 11歳以上15歳未満 1回2/3包、7歳以上11歳未満 1回1/2包 3歳以上7歳未満 1回1/3包 1日2～3回食後に服用する。ただし、1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩服用する。
平成3年2月22日

呼吸器官用薬

ゼントップ「協励」
②
淡茶褐色の粉末で特異なおい
3包(3.0g)中
dl-塩酸メチルエフェドリン 60mg
グリセリンモノグアヤコールエーテル 180mg
サリチル酸ヘナジン 60mg
無水カフェイン 150mg
カンゾウエキス末C 180mg
ぜんそく、せき、たん
1日3回、適宜服用する。1回大人1包 11才以上～15才未満 2/3包、8才以上～11才未満1/2包 5才以上～8才未満1/3包
昭和42年7月6日

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

医薬部外品1

製品名	ラバルン薬用HPゲル	ラバルン薬用HPクリーム	ラバルン薬用HPローション
分類	医薬部外品	医薬部外品	医薬部外品
剤型	半固形剤ゲルタイプ	半固形剤乳化タイプ	ローションタイプ
成分分量	100g中	100g中	100g中
	へパリン類似物質 0.1g グリチルリチン酸ジカリウム 0.1g	へパリン類似物質 0.1g グリチルリチン酸ジカリウム 0.1g	へパリン類似物質 0.1g グリチルリチン酸ジカリウム 0.1g
効能効果	肌あれ、あれ性。あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。	肌あれ、あれ性。あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。	肌あれ、あれ性。あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。
用法用量	適量を皮膚に塗布する。	適量を皮膚に塗布する。	適量を皮膚に塗布する。
承認日	令和3年11月12日	令和3年11月16日	令和3年11月12日
一物多名称	マユール薬用HPゲル	マユール薬用HPクリーム	マユール薬用HPローション
	プライル薬用HPゲル	プライル薬用HPクリーム	プライル薬用HPローション

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

医薬部外品2

消毒剤

含嗽薬(液剤)

製品名	ヒフォルA薬用手指消毒液■	ヒフォルA薬用手指消毒ジェル■	ヒフォルL薬用手指消毒ジェル	ヒフォルラップハン	ケーパイン消毒液A■	ヒフォルクリアうがい薬■
分類	新指定医薬部外品	新指定医薬部外品	新指定医薬部外品	指定医薬部外品	指定医薬部外品	
剤型	消毒剤	消毒剤	消毒剤	ローション	無色透明の液体	含嗽薬(液剤)
成分分量	100mL中	100mL中	100mL中	100g中	100ml	100ml中
	ベンザルコニウム塩化物 0.05g	ベンザルコニウム塩化物 0.05g	ベンザルコニウム塩化物 0.05g	トリクロカルハニリド 0.1g	ベンザルコニウム塩化物 0.05g	セチルピリジニウム塩化物水和物 0.25g グリチルリチン酸二カリウム 0.25g
効能効果	手指・皮膚の洗浄・消毒	手指・皮膚の洗浄・消毒	手指・皮膚の洗浄・消毒	すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆)	すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒	口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去
用法用量	適量を手指に取り、塗布または塗擦する。	適量を手指に取り、塗布または塗擦する。	適量を手指に取り、塗布または塗擦する。	傷面の水分や付着物をよくふきとり、適量を患部に塗布し乾燥させる。	1日数回患部に噴霧又はガーゼ、脱脂綿などに浸して塗布する。	1回約1mLを約50mLの水にうすめてうがいする。1日数回行う。
承認日	令和2年6月29日	令和2年6月23日	令和2年6月23日	平成23年9月5日	平成12年10月23日	令和3年3月26日
一物多名称	オノフェA薬用手指消毒液	オノフェA薬用手指消毒ジェル	オノフェL薬用手指消毒ジェル	ラカナラップハン	ケーパイン消毒液E	エプールクリアうがい薬
	エプールA薬用手指消毒液	エプールA薬用手指消毒ジェル■	エプールL薬用手指消毒ジェル	エフカイラップハン■	エプール消毒液	エフカイクリアうがい薬■
	ラホヤA薬用手指消毒液	ラホヤA薬用手指消毒ジェル■	ラホヤL薬用手指消毒ジェル	トロマラップハン	アージュ消毒液	イマジンクリアうがい薬■
	ラウマーA薬用手指消毒液■	ラウマーA薬用手指消毒ジェル	ラウマーL薬用手指消毒ジェル	ラップハン		ハンキョークリアうがい薬
	モンルナA薬用手指消毒液	モンルナA薬用手指消毒ジェル	モンルナL薬用手指消毒ジェル	ラップ絆A■		
				ラップハン液体絆創膏■		

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

医薬部外品3

	薬用化粧品	薬用化粧品	薬用化粧品	薬用化粧品	薬用化粧品
製品名	キャミレルクリームエクセレントQ■	ヒフォルL	ナチュリア プラス	ナチュリア	ナチュリアスキンソフナー
分類					
性状	黄色のクリーム	芳香の無色澄明の液	芳香の乳白色の乳液	芳香の乳白色の乳液	芳香の無色澄明の液
成分分量	100g中	100ml中	100g中	100g中	100ml中
	グリチルリチン酸ジカリウム 0.1g	イソプロピルメチルフェノール 0.03g グリチルリチン酸二カリウム 0.1g	グリチルリチン酸モノアンモニウム 0.1g イソプロピルメチルフェノール 0.1g アラントイン 0.1g	グリチルリチン酸モノアンモニウム 0.1g イソプロピルメチルフェノール 0.1g アラントイン 0.1g	グリチルリチン酸モノアンモニウム 0.1g アラントイン 0.1g ヒオカタイザープレセンタ 1.0g
効能効果	肌あれ。あれ性。肌をひきしめる。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。	肌あれ。あれ性。あせも。ひび。にきびを防ぐ。肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌をととのえる。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。	あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。	あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。	日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。
用法用量	適宜適量を皮膚に塗布する。	適量を皮膚に塗布する。	適量を取り、指先で肌に塗る。	適量を取り、指先で肌に塗る。	手のひらに適量を取り、肌に塗布する。
承認日	平成24年9月25日	平成19年9月13日	平成3年2月12日	平成2年12月12日	平成2年6月19日
一物多名称	マユールαクリーム	ラウマーL			
	プラマルαクリーム	エフカIL			
	ナルガαクリーム	オノフェL			
		オートベルベ			
		オートナルガ			
		オートナルガ			
		オートラホヤ			
		オートトロマ			
	オートテーマ				

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

医薬部外品4

	薬用化粧品	薬用化粧品	口中清涼剤	腋臭防止剤	腋臭防止剤	腋臭防止剤	腋臭防止剤
製品名	パールソフトクリーム	アクリネーション「万協」	薬用デンタルDEW	ハンパソフト	デオブランカローション■	パールソフト	デオブランカクリーム
分類							
性状	白色のクリーム	芳香の白色乳状液	芳香の無色澄明の液	白色の乳液	無色澄明の芳香の液	白色の芳香の乳液	白色の芳香の軟膏
成分分量	100g中	100ml	100ml中	100g中	100ml中	100g中	100g中
	ステアリルグリチルレチネート 0.05g γ-オリザノール 0.5g イソプロピルメチルフェノール 0.07g	塩化ベンザルコニウム 0.01g パラオキシ安息香酸エチル 0.025g パラオキシ安息香酸プロピル 0.015g	塩化セチルピリジニウム 0.02g	グリチルレチン酸ステアリル 0.05g イソプロピルメチルフェノール 0.03g dl-ピロリドンカルボン酸ナトリウム 液 1.0g	アルミニウムヒドロキシクロライド 5.0g ベンザルコニウム塩化物 0.05g	ステアリルグリチルレチネート 0.05g イソプロピルメチルフェノール 0.3g	アラントインクロロヒドロキシアルミニ ウム 0.5g イソプロピルメチルフェノール 0.1g β-グリチルレチン酸 0.5g メントール 0.75g
効能効果	肌あれ、あれ性。あせも・しもやけ・ひび・あかぎれを防ぐ。かみそりまけを防ぐ。日やけによるしみ、そばかすを防ぐ。日やけ・雪やけ後のほてり。肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。	肌あれ、ひび、あかぎれ、皮膚の保護及び汚れの除去	歯根(肉)炎の予防、歯を白くする、口中を浄化する。	皮膚の清浄・殺菌・消毒。体臭・汗臭及びにきびを防ぐ。	わきが(腋臭)、皮膚汗臭、制汗	皮膚の清浄・殺菌・消毒。体臭・汗臭及びにきびを防ぐ。	制汗、わきが、汗臭
用法用量	適量をとって、適宜手指または皮膚に塗擦する。	手のひら又は脱脂綿に適量をとって、1日数回患部に塗擦する。	適量(約10ml)を口に含み、ブラッシングする。	洗顔、入浴時に適量の水または温湯を使って泡立てて皮膚を洗ったのち十分に洗い流す。	適宜、適宜量を汗の出やすいところに塗布するか、または、噴霧する。	洗顔、入浴時に適量の水又は温湯を使って泡立てて皮膚を洗った後、十分に洗い流す。	1日、1回～数回、適宜量を汗の出やすいところに塗布するかまたはすりこむ。
承認日	昭和57年11月10日	昭和37年5月11日	平成2年9月5日	昭和59年11月19日	昭和58年3月12日	昭和57年8月30日	昭和54年2月20日
一物多名称	ハンパソフトクリーム	アクリネーション「万協」					

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

医薬部外品5

薬用歯みがき類

き避剤

き避剤

シャンプー

浴用剤

浴用剤

てんか粉類

製品名	新デンタルS「万協」	ペレトセリ	ペレトクリーム	ヒパールコンディショニングシャンプー	ハイザブーン〈グリーン〉	ハイザブーン	スキンパウダー「万協」
分類							
性状	芳香の白色の軟膏	無色透明ゼリー状軟膏	芳香の白色クリーム状	白色の粘性のある液体	橙黄赤色の芳香の結晶粉末	橙黄赤色の芳香の結晶粉末	白色の微粉末
成分分量	100g中	100g中	100g中	100g中	100g中	100g中	100g中
	グリチルレチン酸 0.03g クロルヘキシジン塩酸塩 0.02g アラントインクロロヒドロキシアルミニウム 0.2g	デイト 5.0g	ジエチルアラミト 5.0g ジフェニドラミン 1.0g トメントール 0.5g カンフル 0.5g	ミコナゾール塩酸塩 0.75g グリチルレチン酸ジカリウム 0.1g	乾燥硫酸ナトリウム 58.0g セスキ炭酸ナトリウム 38.173g	炭酸水素ナトリウム 25.0g 炭酸ナトリウム 40.0g ホウ砂 30.0g 塩化ナトリウム 5.0g	亜鉛華 20.0g 沈降炭酸カルシウム 20.0g ホウ酸 5.0g
効能効果	歯槽膿漏の予防、歯根(肉)炎の予防、むし歯を予防、歯を白くする。	蚊、のみ、さしばえの刺咬の防止	蚊、ブヨ、蚤、南京虫、虱、ダニ、毒蛾、蟻等の害虫による虫さされの予防	フケ・かゆみを防ぐ。毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。毛髪・頭皮を清浄にする。毛髪・頭皮をすこやかに保つ。	肩のこり、くじき、腰痛、神経痛、リウマチ、あせも、ただれ、しっしん、荒れ性、にきび、吹き出物、冷え性、ひび、あかぎれ、しもやけ、痔	あせも、荒れ性、うちみ、肩のこり、くじき、神経痛、しっしん、しもやけ、痔、ただれ、冷え性、腰痛、リウマチ	あせも、おしめかぶれ、かみそりまけ、ただれ、ひげそりあと、股ずれ
用法用量	適量を歯ブラシにとり、歯及び歯ぐきを塗擦する。	1日、1～数回、手及び足などの害虫がさしやすい部位に、適量を塗布するかまたはすり込む。	1日数回適宜皮膚にすり込む。	適量を手にとり、頭皮をマサージするようによく洗ってからすすいでください。	家庭用風呂には8～10gを適当の温湯に溶かして使用する。洗顔またはおしぼりには、耳かき3～4杯を洗面器の温湯に溶かし使用する。	家庭風呂には8.0～9.0gを適当の温度の浴湯に溶解し使用する。洗顔には耳かき3～4杯を洗面器の温湯に溶かし使用する。	1日数回適量を撒布する。
承認日	昭和59年5月23日	昭和55年7月10日	昭和38年7月12日	平成27年9月2日	昭和44年9月17日	昭和36年10月15日	昭和36年10月15日
一物多名称				エパールコンディショニングシャンプー			
				パンプスコンディショニングシャンプー			
				デオフランコンディショニングシャンプー■			
				パンプキーコンディショニングシャンプー			

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

化粧品1

製品名	まごこサミンクリームA■	まごころオールインワンジェル■	まごころシャンプーSA■	まごころトリートメントSA■	まごころホテジジェル姫■	まごころ乳液こまめ■	まごころteaハンドジェル■
種別	保湿クリーム	ゲル剤	ヘアシャンプー	ヘアリンス	ゲル剤	乳剤	ゲル剤
性状	淡褐色のクリーム	赤色のゲル	白色の粘性のある液体	白色～乳白色のクリーム	透明のゲル	白色～乳白色の乳液	白色～乳白色のゲル
表示成分	水、グルコサミンHCl、BG、グリセリン、パルミチン酸セチル、ジメチコン、ステアリン酸グリセリル(SE)、セタノール、ミネラルオイル、ミリスチン酸イソプロピル、ステアリン酸PEG-40、ラベンダー油、メントール、メチルパラベン、プロピルパラベン、チャエキス、ショウガ根茎エキス、エタノール、キサンタンガム、TEA、EDTA-2Na	水、BG、グリセリン、ベタイン、アスタキサンチン、ヘマトコッカスプルビリアスエキス、プラセンタエキス、チャエキス、ダマスクバラ花油、(PEG-240/デシルテシラデセス-20/HDI)コポリマー、ラウリン酸K、トコフェロール、シクロデキストリン、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリン、PEG-60、エタノール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、赤102	水、ラウレス硫酸Na、ラウレス-11カルボン酸Na、ココトプロピルベタイン、DPG、イソステアミドプロピルベタイン、ココトメチルMEA、ジステアリン酸グリコール、BG、グリセリン、ホリクオテウム-52、ホリクオテウム-10、ラウレス-16、チャエキス、ソメイヨシノ葉エキス、パール、シトルス(タチバナ/レチクワ)果皮油、ヒン果実エキス、セタノール、アモジメチコン、セテアレス-7、セテアレス-13、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、フェノキシエタノール、エタノール、塩化Na、酢酸、酢酸Na、イソトロン酸、安息香酸Na、ヘンテ酸5Na、EDTA-2Na、EDTA-3Na、硫酸Na、リン酸、メチルパラベン、BHT、香料	水、ジメチコン、アホガド油、セタノール、テトラエチルヘキサン酸ペンタエリスリチル、セトリモニウムプロピド、ステアリンアルコール、BG、ステアトリモニウムプロピド、ジステアリン酸スクロース、ミリスチルメチルβ-アラニン、ラウリン酸スクロース、チャエキス、ソメイヨシノ葉エキス、パール、シトルス(タチバナ/レチクワ)果皮油、ヒン果実エキス、ヒアルロン酸Na、メチルイソアゾリリン、シクロペンタシロキサン、ジメチコノール、エタノール、イソプロパノール、EDTA-2Na、BHT、香料	水、BG、グリセリン、ベタイン、PEG-60水添ヒマシ油、チャエキス、アズキ種子エキス、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸アルキル(C12-13)グリセリル、シトルス(タチバナ/レチクワ)果皮油、オレンジ果汁、レモン果汁、ライム果汁、リンゴ果汁、モモ果汁、グレープフルーツ果実エキス、サンザシエキス、ナツメ果実エキス、グリチルリチン酸2K、カルホマー、水酸化K、エタノール、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、ブチルパラベン	水、PPG-10メチルグルコース、イソステアリン酸PEG-20ソルビタン、ステアリン酸グリセリル、ステアリンアルコール、ヘニルアルコール、スクワラン、オレフィンオリゴマー、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドテシル)、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、チャエキス、アズキ種子エキス、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸アルキル(C12-13)グリセリル、コメ発酵液、ジメチコン、ヒドロキシエチルセルロース、TEA、EDTA-2Na、エタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン	水、BG、グリセリン、ベタイン、シクロペンタシロキサン、チャエキス、カキ葉エキス、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、加水分解コラーゲン、セラミド3、アロエラ液汁末、ホホバ油、オレンジ油、トコフェロール、コレカルシフェロール、ホリアクリル酸Na、グリチルリチン酸2K、ホリソルベート60、ジメチコン、カルホマー、デキストリン、エタノール、メチルパラベン、水酸化K
用法用量	手のひらに適量を取り、前進になじませてください。	洗顔のあと、適量を手にとり、やさしく顔全体になじませます。	髪を十分に予洗いした後、適量を手のひらで泡立てて髪全体に十分になじませ、丁寧に洗います。その後十分にすすぎます。	シャンプー後十分に水気をとり、毛先中心に適量塗布し、全体になじませます。その後毛先をもみ込み、ぬるま湯ですすぎ流します。	手のひらに適量を取り、デコルテ、腕、足などの全身になじませてください。	化粧水等で肌を整えた後、適量を手のひらにとり、顔全体にやさしくのぼしてください。	適量(パール粒くらい)を指先にとり、お肌ののぼしながら、やさしくなじませてください。
届出日	令和1年8月28日	平成29年10月12日	平成28年1月31日	平成28年1月31日	平成27年3月16日	平成26年4月28日	平成22年9月30日
一物多名称							ヒパールHジェル エパールHジェル オノフェHジェル ラウマーHジェル ラホヤHジェル キルカミンHジェル シタコHジェル トロマHジェル エフカイHジェル ラカナウHジェル コクソスHジェル デオプランカHジェル バンキーHジェル

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

化粧品2

製品名	まごころ化粧水 希■	ゆず香るまごころhoney クリーム■	クロスレットフルールクリーム■	ヒフォルリアクリーム■	伊賀菱忍者クリーム■	伊勢志摩真珠クリーム■	熊野古道クリーム■
種別	ローション剤	クリーム	クリーム	クリーム	クリーム	クリーム	クリーム
性状	無色澄明	白色～微黄色のクリーム	淡黄白色のクリーム	微黄白色～淡黄白色のクリーム	白色のクリーム	白色のクリーム	白色のクリーム
表示成分	水、BG、グリセリン、チャエキス、加水分解ヒアルロン酸、コム発酵液、ダイズエキス、加水分解コラーゲン、セラミド3、アスコルビルリン酸Na、加水分解コンスターチ、トコフェロール、コレカルシフェロール、PEG-60水添ヒマシ油、ヒドロキシエチルセルロース、PPG-10メチルグルコース、エタノール、クエン酸Na、クエン酸、フェキシエタノール、香料	水、グリセリン、オレフィンオリゴマー、シメチコン、テトラエチルヘキサン酸ペンタエリスリチル、BG、PEG-150、ミリスチン酸デキストリン、ホリリシリン酸ホリグリセリル-6、ワセリン、ハチミツ、ヒアルロン酸Na、セラミド3、ユス果皮油、レモン果皮油、チャエキス、アロエラ液汁末、マイクロクリタリンワックス、イソステアリン酸ホリグリセリル-2、システアルジモニウムヘクトライト	水、スクワラン、ヘニルアルコール、BG、パルミチン酸オクチル、シクロペンタシロキサン、ホホバ油、ペンタステアリン酸ホリグリセリル-10、ハナヒラタケ末、シメチコン、ユビキノン、アウルオバシジウムブルランス培養物、チャエキス、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸アルキル(C12-13グリセリル)、テトラヘキシルテカン酸アスコルビル、酢酸トコフェロール、加水分解コラーゲン、セラミド3、加水分解コンスターチ、トコフェロール、コレカルシフェロール、グリチルリチン酸2K、キサンタンガム、PEG-100水添ヒマシ油、ステアロイル乳酸Na、ステアロイルメチルタウリンNa、エタノール、EDTA-2Na、プロピルパラベン、メチルパラベン、エチルパラベン、香料	ワセリン、水、BG、パラフィン、オレイン酸ソルビタン、グリセリン、ミネラルオイル、カルナウハロウ、コレステロール、セラミド3、パルミチン酸セチル、オレイン酸、アルキニン、カルホキシビニルポリマー、セタノール、水添レシチン、シア脂	水、ミネラルオイル、スクワラン、1,2-ヘキサジニオール、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa)コホリマー、加水分解ダイズタンパク、コメヌカ油、ヒン果実エキス、チャ葉エキス、テトラヘキシルテカン酸アスコルビル、ヒアルロン酸Na、加水分解シルク、加水分解コラーゲン、加水分解コンスターチ、セラミド3、酢酸トコフェロール、BG、ホリソルベート60、テトラオレイン酸ソルベス-60	水、スクワラン、ヘニルアルコール、PG、パルミチン酸オクチル、シクロペンタシロキサン、ホホバ油、ペンタステアリン酸ホリグリセリル-10、パール、ヒトエグサ葉状体エキス、デキストリン、テトラヘキシルテカン酸アスコルビル、カトリン、グレープフルーツ果皮油、PEG-100水添ヒマシ油、シメチコン、キサンタンガム、ステアロイルメチルタウリンNa、ステアロイル乳酸Na、EDTA-2Na、メチルパラベン、プロピルパラベン	水(海洋深層水)、ソルビトール、グリセリン、PG、ステアリルアルコール、オクタ酸セチル、ミリスチン酸イソプロピル、パラフィン、スクワラン、ステアリン酸、ミツロウ、オイスターエキス、ヒマシ油、オレンジ油、カルボマー、シメチコン、メチルパラベン、プロピルパラベン、水酸化K、TEA
用法用量	手のひらに適量をとり、お顔全体になじませてください。	適量(パール粒くらい)を指先にとり、お肌へのぼしながら、やさしくなじませてください。	適量(パール粒くらい)を指先にとり、お肌へのぼしながら、やさしくなじませてください。	適量を指先にとり、お肌へのぼしながら、やさしくなじませてください。手のひらで温めながら、ゆっくり伸ばすとよりなじませやすくなります。	適量(パール粒1～2個分)を指先にとり、お肌へのぼしながら、やさしくなじませてください。	適量(パール粒くらい)を指先にとり、お肌へのぼしながら、やさしくなじませてください。	適量(パール粒くらい)を指先にとり、お肌へのぼしながら、やさしくなじませてください。
届出日	平成25年4月22日	平成24年1月12日	平成26年4月24日	平成23年7月4日	平成22年9月30日	平成21年12月14日	平成18年4月21日
一物多名称				パールムユリアクリーム■	菱の実クリーム	伊勢志摩クリーム	
					ヒフォルNクリーム		
					エパールNクリーム		
					オノフェNクリーム		
					ラウマールNクリーム		
					ラホヤNクリーム		
					キルガミンNクリーム		
					シタコNクリーム		
					トロマンNクリーム		
					エフカイNクリーム		
					ラカナウンNクリーム		
					ココソスNクリーム		
					デオブランクNクリーム		
					ハンキーNクリーム		

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

化粧品3

製品名	熊野古道乳液 ■	ぼっちゃりクリーム	猪の倉源泉クリーム ■	キャミレールQ10クリームエクセレント ■	キャミレールQ10クリーム ■	エイグリーンEジェル ■	エイグリーンクリームジェル ■
種別	乳剤	クリーム	クリーム	クリーム	クリーム	ジェル	ジェル
性状	白色の乳液	淡黄白色のクリーム	白色のクリーム	淡黄白色のクリーム	淡黄白色のクリーム	半透明の粘性の液	白色の粘性の液
表示成分	水(海洋深層水)、ソルビトール、グリセリン、PG、ステアリアルアルコール、オクタ酸セシル、ミリスチン酸イソプロピル、パラフィン、スクワラン、ステアリン酸、ミツロウ、オイスターエキス、ヒノキ油、オレジン油、カルボマー、ジメチコン、メチルパラベン、プロピルパラベン、水酸化K、TEA	水、加水分解コラーゲン、加水分解コーンスターチ、セラミド-3、トコフェロール、ホホバ油、グリセリン、ホリソルベート60、ゲットウ葉エキス、BG、カルボマー、アロエベラ液汁末、TEA、メチルパラベン、プロピルパラベン、フェノキシエタノール	水、ソルビトール、温泉水、グリセリン、PG、ステアリアルアルコール、オクタ酸セシル、尿素、ミリスチン酸イソプロピル、パラフィン、スクワラン、ステアリン酸、ミツロウ、ヒノキ油、カルボマー、ジメチコン、メチルパラベン、プロピルパラベン、水酸化K、TEA	水、スクワラン、ヘニールアルコール、BG、パルミチン酸オクチル、シクロペンタンロキサン、ホホバ油、ヘンタステアリン酸ホリグリセリル-10、セリシン、ジメチコン、ユビキノン、チオクト酸、セラミド-3、加水分解コラーゲン、加水分解コーンスターチ、グリセリン、酢酸トコフェロール、トコフェロール、コレカルシフェロール、テトラヘキシルテカン酸アスコルビル、グリチルリチン酸2K、ヒアルロン酸Na、キサンタンガム、PEG-100水添ヒマシ油、ステアロイル乳酸Na、ステアロイルメチルタウリンNa、ミリスチン酸ホリグリセリル-10、カプリル酸PG、エタノール、EDTA-2Na、プロピルパラベン、メチルパラベン	水、スクワラン、シクロメチコン、グリセリン、BG、ホホバ油、水添レシチン、ステアリン酸、ヘニールアルコール、パルミチン酸セシル、セリシン、テトラヘキシルテカン酸アスコルビル、酢酸トコフェロール、メチルパラベン、プロピルパラベン、グリチルリチン酸2K、キサンタンガム、ユビキノン、ヒアルロン酸Na、EDTA-2Na	酢酸dl-α-トコフェロール、トリエタノールアミン、パラベン	酢酸dl-α-トコフェロール、トリエタノールアミン、パラベン
用法用量	適量(ピー玉くらい)を手にとり、お肌へのぼしながら、やさしくなじませてください。入浴後やおやすみ前にお使いになると一層効果的です。	適量(パール粒くらい)を指先にとり、お肌へのぼしながら、やさしくなじませてください。	適量(パール粒くらい)を指先にとり、お肌へのぼしながら、やさしくなじませてください。	適量(パール粒くらい)を指先にとり、お肌へのぼしながら、やさしくなじませてください。	適量(パール粒くらい)を指先にとり、お肌へのぼしながら、やさしくなじませてください。	必要な量を取り、顔や体に擦り込んでください。	必要な量を取り、顔や体に擦り込んでください。
届出日	平成22年1月15日	平成17年1月19日	平成19年11月22日	平成20年9月16日	平成17年1月19日	平成19年11月29日	平成15年2月20日
一物多名称	素肌美ローション ムネノドゥローション ムネノドゥ乳液 クマリッチミルク クマのコローション ハントコミュニケーション乳液 クマノドゥ乳液 りらっくすローション 熊野肌乳液						

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。

化粧品4

製品名	エルブジュールマイルドコンディショナー■	エルブジュールマイルドシャンプー■	エルブジュールリフレッシュクレンジング■	エルブジュールモイスクローション■	エルブジュールピュアリッチオイル■	エルブジュールトリートメントマスク■	エルブジュールアロマエッセンスクリーム■
種別	コンディショナー	シャンプー	クレンジングクリーム	化粧水	オイル	マスク	クリーム
性状	芳香の白い粘性のある液	芳香の茶色い粘性のある液	芳香の白色のクリーム	芳香の無色澄明の液	芳香の黄色澄明の液	芳香の薄茶色のクリーム	芳香の淡黄白色のクリーム
表示成分	水・オリーブ油・ハイフリットヒマワリ油・アルキル(C12,14)オキシヒドロキシプロピルアルキルニオンHCl・セタノール・加水分解コムキ・ペタイン・ホホバ油・アーモンド油・ステアリアルアルコール・ブチレン油・スパイクラベンダー油・ジャスミン油・グアールヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド・フェノキシエタノール・コイルアルキルニオンエチルPCA・クエン酸	水・コイルメチルアラニンNa・ラウリルグルコシド・ハチミツ・シナノキエキス・ヒドロキシプロピルグアールヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド・ローズマリー油・スパイクラベンダー油・イランイラン油・ペイ油・タイム油・リンゴタンニン・ヒノキチオール・ペンチレングリコール・フェノキシエタノール・クエン酸	水・ハイフリットヒマワリ油・カンテン・レモン油・イランイラン油・グレープフルーツ果皮油・セラニウム油・フェノキシエタノール・コイルアルキルニオンエチルPCA	水・ハマリス水・ハチミツ・ソウハクヒエキス・エチナシ根エキス・ティーツリー油・タイム油・ラベンダー油・ローズ油・ペンチレングリコール・フェノキシエタノール・BG	ヒマワリ油・ハイフリットヒマワリ油・コムキ胚芽油・レモン油・グレープフルーツ果皮油	水・ハイフリットヒマワリ油・ハマリス水・カンテン・コムキ胚芽油・アホカド油・ソウハクヒエキス・アスハラサスリネアリスエキス・カオリン・ペントナイト・セラニウム油・フェノキシエタノール・ペンチレングリコール・コイルアルキルニオンエチルPCA	水・ハイフリットヒマワリ油・ハチミツ・カンテン・ゼニアオイ花エキス・マロニエエキス・オウゴン根エキス・ソウハクヒエキス・コムキ胚芽油・レシチン・ブチレン油・甘草フラボノイド・アホカド油・ローズ油・フェノキシエタノール・コイルアルキルニオンエチルPCA
用法用量	シャンプーを充分すすいだ後、髪全体になじませます。2～3分程時間を置いてから洗い流すと効果的です。	髪と頭皮をお湯で充分すすいしてから、適量を手に取り泡立て、やさしく洗います。	大さじ1杯程度を手にとり、顔全体になじませたら、ティッシュまたは蒸しタオルでやさしく拭きとります。	たっぷりの量をコットンに含ませ、お肌がひんやりするまでやさしくパッティングします。	指がなめらかにすべるくらいたっぷりと顔にのせ、やさしくマッサージ。(量は小さじ2～3杯が目安です)	大さじ1～2杯分を手にとり顔全体にのせ、15～20分程度おき、蒸しタオルでやさしく拭きとります。	小さじ1杯程度を手にとり、顔全体になじませます。
届出日	平成17年12月6日	平成17年12月6日	平成17年8月19日	平成17年8月19日	平成17年8月19日	平成17年8月19日	平成17年8月19日

健康食品

製品名	ジンジャータブレット■	華蓮■	華蓮タブレット■
種別	ジンジャー(しょうが)抽出物含有食品	乳酸発酵ハナビラタケ加工食品(顆粒)	乳酸発酵ハナビラタケ加工食品(タブレット)
性状	黄色	浅黄茶色～黄茶色	浅黄茶色～黄茶色
表示成分	澱粉分解物、ミルクカルシウム(乳成分を含む)、結晶セルロース、ジンジャー(しょうが)抽出物、レシチン(大豆由来)、ステアリン酸Ca	乳酸発酵ハナビラタケ粉末	ハナビラタケパウダー、ビフィズス菌、乳酸菌、コラーゲンペプチド等
お召し上がり方	1日3～6粒を目安に白湯または水でお召し上がりください。	1日1～2包を目安に白湯または水でお召し上がりください。	1日5～8粒を目安に白湯または水でお召し上がりください。

食品添加物製剤

製品名	イマジーンZ■	エプールAL65■
性状	無色の液体で、においが ないか又はわずかに塩素 のにおいがある。	無色澄明の液である。
成分	次亜塩素酸ナトリウム、pH調 整剤、水	エタノール、乳酸、グリシン、食 品香料、水
用途	室内、厨房、トイレ等の除 菌・消臭	調理用具、調理機器類の 除菌や食品の品質保持

衛生雑貨品

デリケートS うるおいゼリー■	ジューシーラブ■
無色透明～半透明のゼ リー状で、わずかに特異な においがある。	白色の軟膏剤で、ラベン ダーのほのかな香りがす る。
ヒドロキシエチルセルロース、グリセ リン、PG、pH調整剤、パラ ベン、炭酸水素Na、コラーゲン、 ヒアルロン酸Na、水	パルミチン酸セチル、トコフェロール 酢酸エステル、アラントイン、パラ ベン、トメントール、ラベンダー 油、ワセリン、ステアリン酸ブチ ル、セタノール
潤滑剤、ホディマッサージ	潤滑剤

※販売名の後に■が付いているものは既発売品もしくは発売予定品です。